



Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Wydział Oceny Technologii Medycznych

Atrovastatinum, Lovastatinum, Simvastatinum
we wskazaniu:

ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów

Opracowanie na potrzeby oceny zasadności dalszego finansowania leków zawierających daną substancję czynną we wskazaniach innych niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Aneks do raportu nr: OT.4321.35.2018

Data ukończenia: 12 grudnia 2018 r.

Spis treści

| | |
|--|----------|
| 1. Przedmiot i historia zlecenia | 3 |
| 2. Rekomendacje kliniczne | 4 |
| 3. Wskazanie dowodów naukowych | 5 |
| 3.1. Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów | 5 |
| 3.1.1. Wyszukiwanie dowodów naukowych | 5 |
| 3.1.2. Opis badań włączonych do analizy..... | 5 |
| 3.1.3. Wyniki analizy skuteczności klinicznej..... | 5 |
| 3.1.4. Wyniki analizy bezpieczeństwa | 5 |
| 3.2. Omówienie wyników badań oraz ograniczenia analizy klinicznej | 6 |
| 4. Źródła..... | 7 |
| 5. Załączniki..... | 9 |
| 5.1. Wykaz leków zawierających ocenianą substancję czynną finansowanych ze środków publicznych w ramach ocenianego wskazania | 9 |
| 5.2. Strategia wyszukiwania publikacji | 15 |

1. Przedmiot i historia zlecenia

W związku z art. 40 pkt. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2017 poz. 1844 z późn. zm.) niniejsze opracowanie stanowi aneks do raportu nr AOTMIT-OT-434-36/2015 [Zal 1], na podstawie którego została wydana Opinia Rady Przejrzystości nr 40/2016 [Zal 2] z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną atorvastatinum, lovastatinum, simvastatinum we wskazaniach innych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, tj. ciężkiej wtórnej hipercholesterolemii u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów.

Niniejszy raport stanowi aktualizację danych zawartych w poprzednich opracowaniach w zakresie:

- istnienia nowych wytycznych praktyki klinicznej;
- istnienia nowych dowodów naukowych na potrzeby oceny skuteczności i bezpieczeństwa ocenianej technologii medycznej.

2. Rekomendacje kliniczne

W dniu 30.11.2018 r. przeprowadzono wyszukiwanie, którego celem było zaktualizowanie informacji o wytycznych praktyki klinicznej opisanych w raporcie AOTMiT z 2016 roku.

Przeszukano następujące źródła w celu odnalezienia wytycznych praktyki klinicznej:

- polskie: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne (PTN),
- europejskie i/lub międzynarodowe: *National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)*, *Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)*, *Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE)*, *National Health and Medical Research Council (NHMRC)*, *U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)*, *Agency for Healthcare Research and Quality's (AHRQ)*, *American Association of Clinical Endocrinologists (AACE)*.

W wyniku przeprowadzonego wyszukiwania odnaleziono jedną nową rekomendację kliniczną dotyczącą przedmiotowego tematu. Najważniejsze informacje zawarte w odnalezionych wytycznych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Przegląd interwencji wg wytycznych praktyki klinicznej

| Organizacja, rok (kraj/region) | Rekomendowane interwencje | |
|--|---|--|
| American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), 2017 (Stany Zjednoczone) | <p>W przypadku występowania dyslipidemii można rozważyć leczenie farmakologiczne u dzieci i młodzieży w wieku powyżej 10 lat, jeśli spełniają następujące kryteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LDL-C \geq 190 mg / dL lub • LDL-C \geq 160 mg / dL i mają dodatkowo: <ul style="list-style-type: none"> ➢ dwa lub więcej czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, nawet po intensywnym leczeniu ➢ z nadwagą lub otyłością lub z innymi elementami zespołu oporności na insulinę; i / lub ➢ wywiad rodzinny z przedwczesnym ASCVD (przed 55 rokiem życia) [4]. <p>Ponadto wskazuje się, że u dzieci z cukrzycą należy rozważyć interwencje farmakologiczną w przypadku, jeśli stężenie LDL-C wynosi 130 mg / dL lub więcej [4].</p> <p>Przyjęto, że statyny uważa się za bezpieczną i skuteczną terapię w leczeniu dyslipidemii u młodych osób z grupy wysokiego ryzyka [4].</p> | |
| | <p>Ocena dowodów</p> | |
| | <p>Poziom dowodów</p> | <p>Dowody</p> |
| | <p>1</p> | <p>Metaanaliza randomizowanych badań kontrolnych (MRCT)</p> |
| | <p>1</p> | <p>Badanie z randomizacją (RCT)</p> |
| | <p>2</p> | <p>Metaanaliza nierandomizowanych prospektywnych lub kontrolowanych przypadków klinicznych</p> |
| | <p>2</p> | <p>Badanie bez randomizacji (NRCT)</p> |
| | <p>2</p> | <p>Prospektywne badanie kohortowe (PCS)</p> |
| | <p>2</p> | <p>Retrospektywny opis przypadków (RCCS)</p> |
| | <p>3</p> | <p>Badania przekrojowe (CSS)</p> |
| | <p>3</p> | <p>Badania epidemiologiczne (SS)</p> |
| | <p>3</p> | <p>Opis serii przypadków (CCS)</p> |
| | <p>4</p> | <p>Opis jednego przypadku (SCR)</p> |
| <p>4</p> | <p>Brak dowodów (podejście teoretyczne, opinia ekspercka, konsensus, badanie przedkliniczne) (NE)</p> | |
| <p>Siła dowodów: 1 = silne; 2 = umiarkowane; 3 = słabe; 4 = brak dowodów.</p> | | |
| <p>Osoby biorące udział w przygotowaniu rekomendacji nie zgłaszały konfliktu interesu (brak powiązania w kwestii zatrudnienia). Wszystkie osoby były członkami AACE.</p> | | |

3. Wskazanie dowodów naukowych

3.1. Ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów

3.1.1. Wyszukiwanie dowodów naukowych

Agencja przeprowadziła aktualizację przeglądu systematycznego przeprowadzonego w 2016 roku w celu odnalezienia dowodów naukowych dotyczących skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa stosowania preparatów zawierających *atrovastatinum*, *lovastatinum*, *simvastatinum* w leczeniu ciężkiej wtórnej hipercholesterolemii u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów. Wyszukiwanie przeprowadzono w dniu 30.11.2018 r. w bazach medycznych *Medline* (via *PubMed*), *EMBASE* (via *Ovid*) oraz *The Cochrane Library*. Jako datę odcięcia przyjęto dzień 05.01.2015 r. tj. wyszukiwano badań opublikowanych po dacie wyszukiwania przeprowadzonego w raporcie nr AOTMIT-OT-434-36/2015.

Poniżej przedstawiono kryteria włączenia badań do analizy:

Populacja: dzieci od 10 do 18 r.ż. z wtórną hipercholesterolemią

Interwencja: *atrovastatinum*, *lovastatinum*, *simvastatinum*

Komparator: bez ograniczeń

Punkty końcowe: dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania *atrovastatinum*, *lovastatinum*, *simvastatinum* w analizowanej populacji pacjentów

Typ badań: opracowania wtórne (przeglądy systematyczne), badania pierwotne o najwyższym poziomie wiarygodności, jeśli nie odnaleziono wiarygodnych i aktualnych przeglądów systematycznych, oraz badania pierwotne niewłączone do odnalezionych przeglądów systematycznych, serie przypadków, opisy przypadków

Inne: publikacje w języku angielskim i polskim, pełne teksty publikacji.

3.1.2. Opis badań włączonych do analizy

W trakcie przeszukiwania nie zidentyfikowano publikacji (bardziej aktualnych niż te zawarte w raportach nr AOTM-OT-434-14-2013 oraz AOTMIT-OT-434-36/2015) opisujących przeglądy systematyczne, badania kliniczne lub obserwacyjne, czy też serie lub opisy pojedynczych przypadków dotyczących ocenianej technologii medycznej.

3.1.3. Wyniki analizy skuteczności klinicznej

Nie odnaleziono dowodów naukowych w przedmiotowym zakresie.

3.1.4. Wyniki analizy bezpieczeństwa

Nie odnaleziono dowodów naukowych w przedmiotowym zakresie.

Szczegółowe zapisy dotyczące bezpieczeństwa innych produktów leczniczych zawierających *atrovastatinum*, *lovastatinum*, *simvastatinum*, refundowanych w Polsce – patrz ich Charakterystyki Produktów Leczniczych.

3.2. Omówienie wyników badań oraz ograniczenia analizy klinicznej

W toku prac nad niniejszym raportem nie odnaleziono aktualnych dowodów naukowych odnoszących się do zastosowania atrovastatinum, lovastatinum, simvastatinum we wskazaniu ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10 do 18 roku życia (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo - naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia nefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu I (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów.

4. Źródła

| Rekomendacje kliniczne | |
|------------------------------|--|
| AACE 2017 | Jellinger PS., Handelsman Y., Rosenblit P., et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Guidelines for Management of Dyslipidemia and Prevention of Cardiovascular Disease, Endocrine Practice: April 2017, Vol. 23, No. Supplement 2, pp. 1-87. https://doi.org/10.4158/EP171764.APPGL |
| Pozostałe publikacje | |
| ChPL Apo -Atorva | Charakterystyka Produktu Leczniczego Apo-Atorva 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (10.2013) |
| ChPL Apo-Simva | Charakterystyka Produktu Leczniczego Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg, Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg, Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg (08.2014) |
| ChPL Atoris | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atoris 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (01.2014) |
| ChPL Atoris | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atoris 30 mg, 60 mg, 80 mg, tabletki powlekane (07.2011) |
| ChPL Atorvagen | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atorvagen 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (02.2016) |
| ChPL Atorvastatin Bluefish | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atorvastatin Bluefish 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (07.2011) |
| ChPL Atorvastatin Genoptim | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atorvastatin Genoptim 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg, tabletki powlekane (02.2016) |
| ChPL Atorvastatin Vitama | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atorvastatin Vitama 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (05.2015) |
| ChPL Atorvastatinum 123ratio | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atorvastatinum 123ratio, 10 mg, tabletki powlekane (03.2015) |
| ChPL Atorvastatinum 123ratio | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atorvastatinum 123ratio, 20 mg, tabletki powlekane (03.2015) |
| ChPL Atorvastatinum 123ratio | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atorvastatinum 123ratio, 40 mg, tabletki powlekane (03.2015) |
| ChPL Atorvasterol | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atorvasterol 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (03.2013) |
| ChPL Atorvasterol | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atorvasterol 80 mg, tabletki powlekane (01.2017) |
| ChPL Atorvox | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atorvox 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (04.2011) |
| ChPL Atractin | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atractin 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (05.2015) |
| ChPL Atrox 10, 20, 40 | Charakterystyka Produktu Leczniczego Atrox 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (09.2013) |
| ChPL Corator | Charakterystyka Produktu Leczniczego Corator 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (02.2013) |
| ChPL Lambrinex | Charakterystyka Produktu Leczniczego Lambrinex 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (09.2016) |
| ChPL Larus | Charakterystyka Produktu Leczniczego Larus 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (04.2015) |
| ChPL Liprox | Charakterystyka Produktu Leczniczego Liprox, tabl., 20 mg (10.2013) |
| ChPL Lovasterol | Charakterystyka Produktu Leczniczego Lovasterol tabl., 20 mg (01.2014) |
| ChPL Lovastin | Charakterystyka Produktu Leczniczego Lovastin, tabl., 20 mg (11.2014) |
| ChPL Rapamune | Charakterystyka Produktu Leczniczego Rapamune 1 mg/ml roztwór doustny (03.2015) |
| ChPL Rapamune | Charakterystyka Produktu Leczniczego 1 mg tabletki drażowane (03.2015) |
| ChPL Simcovas | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simcovas tabl. powl., 20 mg, Simcovas tabl. powl., 20 mg (07.2015) |
| ChPL Simorion | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simorion, tabl. powl., 10 mg, Simorion, tabl. powl., 20 mg, Simorion, tabl. powl., 20 mg, Simorion, tabl. powl., 40 mg (12.2014) |
| ChPL Simratio | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simratio 10, tabl. powl., 10 mg (02.2013) |
| ChPL Simratio | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simratio 20, tabl. powl., 20 mg (02.2013) |
| ChPL Simratio | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simratio 40, tabl. powl., 40 mg (02.2013) |
| ChPL Simvacard | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg, Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg, Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg (10.2014) |

| | |
|---------------------------|---|
| ChPL Simvachol | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simvachol, tabl. powl., 10 mg, Simvachol, tabl. powl., 20 mg, Simvachol, tabl. powl., 40 mg (11.2013) |
| ChPL Simvacor | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simvacor, tabl. powl., 10 mg, Simvacor, tabl. powl., 20 mg (06.2012) |
| ChPL Simvagamma | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simvagamma 10, tabl. powl., 10 mg, Simvagamma 20, tabl. powl., 20 mg, Simvagamma 40, tabl. powl., 40 mg (03.2013) |
| ChPL Simvagen | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg, Simvagen 40, tabl. powl., 40 mg (02.2007) |
| ChPL SimvaHEXAL | Charakterystyka Produktu Leczniczego SimvaHEXAL 10, tabl. powl., 10 mg, SimvaHEXAL 20, tabl. powl., 20 mg, SimvaHEXAL 40, tabl. powl., 40 mg (05.2015) |
| ChPL Simvastatin Bluefish | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg (07.2012) |
| ChPL Simvastatin Bluefish | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg (07.2012) |
| ChPL Simvastatin Bluefish | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg (07.2012) |
| ChPL Simvastatin Genoptim | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg, Simvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg (08.2018) |
| ChPL Simvastatinum Accord | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simvastatinum Accord, tabl. powl., 10 mg, Simvastatinum Accord, tabl. powl., 20 mg, Simvastatinum Accord, tabl. powl., 40 mg (11.2017) |
| ChPL Simvasterol | Charakterystyka Produktu Leczniczego Simvasterol, tabl. powl., 10 mg, Simvasterol, tabl. powl., 20 mg, Simvasterol, tabl. powl., 40 mg (12.2014) |
| ChPL Sistas | Charakterystyka Produktu Leczniczego Sistas, tabl. powl., 10 mg, Sistas, tabl. powl., 20 mg, Sistas, tabl. powl., 40 mg (02.2016) |
| ChPL Storvas CRT | Charakterystyka Produktu Leczniczego Larus 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletki powlekane (01.2016) |
| ChPL Torvacard | Charakterystyka Produktu Leczniczego Torvacard 80 mg, tabletki powlekane (11.2016) |
| ChPL Torvacard 10, 20, 40 | Charakterystyka Produktu Leczniczego Torvacard 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (04.2015) |
| ChPL Torvalipin | Charakterystyka Produktu Leczniczego Torvalipin 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (05.2012) |
| ChPL Tulip | Charakterystyka Produktu Leczniczego Tulip 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletki powlekane (12.2015) |
| ChPL Vasilip | Charakterystyka Produktu Leczniczego Vasilip 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (08.2013) |
| ChPL Vastan | Charakterystyka Produktu Leczniczego Ximve 10 mg, 20 mg, tabletki powlekane (02.2014) |
| ChPL Ximve | Charakterystyka Produktu Leczniczego Ximve 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (04.2015) |
| ChPL Zocor 10, 20, 40 | Charakterystyka Produktu Leczniczego Zocor 10 mg, 20 mg, 40 mg, tabletki powlekane (10.2013) |

5. Załączniki

- Zal 1.** Raport nr AOTMIT-OT-434-36/2015 ws. atorvastatinum, lovastatinum, simvastatinum w wybranych wskazaniach pozarejestacyjnych
- Zal 2.** Opinia RP nr 40/2016 z dnia 1 lutego 2016 r. ws. zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną atorvastatinum, lovastatinum, simvastatinum we wskazaniach innych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

5.1. Wykaz leków zawierających ocenianą substancję czynną finansowanych ze środków publicznych w ramach ocenianego wskazania

Tabela 2. Produkty lecznicze zawierające ocenianą substancję czynną refundowane w ocenianym wskazaniu

| Nazwa, postać i dawka leku | Opak. | Kod EAN | UCZ [zł] | CHB [zł] | CD [zł] | WLF [zł] | PO | WDŚ [zł] |
|--|------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|-----|----------|
| 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | | | | | | | | |
| Atorvastatinum | | | | | | | | |
| Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 5909990787586 | 7,94 | 8,34 | 9,64 | 3,76 | 30% | 7,01 |
| Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 5909990787609 | 14,74 | 15,48 | 17,93 | 7,52 | 30% | 12,67 |
| Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. | 5909990787647 | 26,68 | 28,01 | 32,12 | 15,05 | 30% | 21,59 |
| Atoris, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 5909990991815 | 7,94 | 8,34 | 9,64 | 3,76 | 30% | 7,01 |
| Atoris, tabl. powl., 10 mg | 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990336647 | 23,81 | 25,00 | 28,43 | 11,28 | 30% | 20,53 |
| Atoris, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 5909990991914 | 10,91 | 11,46 | 13,91 | 7,52 | 30% | 8,65 |
| Atoris, tabl. powl., 20 mg | 60 tabl. | 5909991013806 | 21,60 | 22,68 | 26,78 | 15,05 | 30% | 16,25 |
| Atoris, tabl. powl., 20 mg | 90 szt. | 5909990419173 | 32,72 | 34,36 | 39,75 | 22,57 | 30% | 23,95 |
| Atoris, tabl. powl., 30 mg | 30 szt. | 5909990885282 | 14,36 | 15,08 | 18,51 | 11,28 | 30% | 10,61 |
| Atoris, tabl. powl., 30 mg | 60 tabl. | 5909990885299 | 27,22 | 28,58 | 33,98 | 22,57 | 30% | 18,18 |
| Atoris, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. | 5909990623464 | 21,60 | 22,68 | 26,78 | 15,05 | 30% | 16,25 |
| Atoris, tabl. powl., 40 mg | 60 tabl. | 5909990623471 | 43,20 | 45,36 | 51,76 | 30,09 | 30% | 30,70 |
| Atoris, tabl. powl., 40 mg | 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990623488 | 68,04 | 71,44 | 79,79 | 45,14 | 30% | 48,19 |
| Atoris, tabl. powl., 60 mg | 30 szt. | 5909990885336 | 34,56 | 36,29 | 41,69 | 22,57 | 30% | 25,89 |
| Atoris, tabl. powl., 80 mg | 30 szt. | 5909990885374 | 45,36 | 47,63 | 54,03 | 30,09 | 30% | 32,97 |
| Atorvagen, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 5909990938926 | 7,78 | 8,17 | 10,61 | 7,52 | 30% | 5,35 |
| Atorvagen, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. | 5909990938995 | 15,55 | 16,33 | 20,43 | 15,05 | 30% | 9,90 |
| Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 5909990887262 | 3,08 | 3,23 | 4,53 | 3,76 | 30% | 1,90 |
| Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 5909990887279 | 6,26 | 6,57 | 9,02 | 7,52 | 30% | 3,76 |
| Atorvastatin Bluefish, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. | 5909990887286 | 12,20 | 12,81 | 16,91 | 15,05 | 30% | 6,38 |
| Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 5909990900053 | 3,43 | 3,60 | 4,90 | 3,76 | 30% | 2,27 |
| Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 5909990899920 | 6,91 | 7,26 | 9,71 | 7,52 | 30% | 4,45 |

| Nazwa, postać i dawka leku | Opak. | Kod EAN | UCZ [zł] | CHB [zł] | CD [zł] | WLF [zł] | PO | WDŚ [zł] |
|--|------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|-----|----------|
| Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 20 mg | 60 tabl. | 5909990899951 | 12,10 | 12,71 | 16,81 | 15,05 | 30% | 6,28 |
| Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 20 mg | 90 tabl. | 5909990899975 | 18,14 | 19,05 | 24,45 | 22,57 | 30% | 8,65 |
| Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. | 5909990900275 | 14,04 | 14,74 | 18,84 | 15,05 | 30% | 8,31 |
| Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 40 mg | 60 tabl. | 5909990900305 | 24,19 | 25,40 | 31,80 | 30,09 | 30% | 10,74 |
| Atorvastatin Genoptim, tabletki powlekane, 40 mg | 90 tabl. | 5909990900336 | 36,29 | 38,10 | 46,45 | 45,14 | 30% | 14,85 |
| Atorvastatin Genoptim, tabl. powl., 80 mg | 30 tabl. | 5909990900459 | 24,62 | 25,85 | 32,26 | 30,09 | 30% | 11,20 |
| Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 5909991200787 | 6,16 | 6,47 | 8,92 | 7,52 | 30% | 3,66 |
| Atorvastatin Vitama, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. | 5909991201050 | 12,31 | 12,93 | 17,03 | 15,05 | 30% | 6,50 |
| Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 5909990848904 | 4,27 | 4,48 | 5,78 | 3,76 | 30% | 3,15 |
| Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 5909990849086 | 7,77 | 8,16 | 10,61 | 7,52 | 30% | 5,35 |
| Atorvastatinum 123ratio, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. | 5909990849246 | 15,44 | 16,21 | 20,31 | 15,05 | 30% | 9,78 |
| Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 5909990077847 | 7,99 | 8,39 | 9,69 | 3,76 | 30% | 7,06 |
| Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 5909990077939 | 15,98 | 16,78 | 19,23 | 7,52 | 30% | 13,97 |
| Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. | 5909990078028 | 31,97 | 33,57 | 37,67 | 15,05 | 30% | 27,14 |
| Atorvasterol, tabl. powl., 80 mg | 30 szt. | 5909991041298 | 28,26 | 29,67 | 36,07 | 30,09 | 30% | 15,01 |
| Atorvox, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990573400 | 7,34 | 7,71 | 9,01 | 3,76 | 30% | 6,38 |
| Atorvox, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990573530 | 12,42 | 13,04 | 15,49 | 7,52 | 30% | 10,23 |
| Atorvox, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990573547 | 23,22 | 24,38 | 28,48 | 15,05 | 30% | 17,95 |
| Atractin, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078141 | 6,03 | 6,33 | 7,63 | 3,76 | 30% | 5,00 |
| Atractin, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078264 | 11,88 | 12,47 | 14,92 | 7,52 | 30% | 9,66 |
| Atractin, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078356 | 23,76 | 24,95 | 29,05 | 15,05 | 30% | 18,52 |
| Atrox, tabl. powl., 80 mg | 30 szt. | 5909991011383 | 32,83 | 34,47 | 40,87 | 30,09 | 30% | 19,81 |
| Atrox 10, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991124618 | 7,75 | 8,14 | 9,44 | 3,76 | 30% | 6,81 |
| Atrox 10, tabl. powl., 10 mg | 60 tabl. | 5907695215137 | 6,34 | 6,66 | 9,11 | 7,52 | 30% | 3,85 |
| Atrox 10, tabl. powl., 10 mg | 90 szt. | 5907695215359 | 9,16 | 9,62 | 13,05 | 11,28 | 30% | 5,15 |
| Atrox 20, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991124717 | 12,05 | 12,65 | 15,10 | 7,52 | 30% | 9,84 |

| Nazwa, postać i dawka leku | Opak. | Kod EAN | UCZ [zł] | CHB [zł] | CD [zł] | WLF [zł] | PO | WDŚ [zł] |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|-----|----------|
| Atrox 20, tabl. powl., 20 mg | 60 tabl. | 5907695215144 | 12,68 | 13,31 | 17,41 | 15,05 | 30% | 6,88 |
| Atrox 20, tabl. powl., 20 mg | 90 szt. | 5907695215366 | 18,32 | 19,24 | 24,63 | 22,57 | 30% | 8,83 |
| Atrox 40, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991124816 | 24,17 | 25,38 | 29,48 | 15,05 | 30% | 18,95 |
| Atrox 40, tabl. powl., 40 mg | 60 tabl. | 5907695215151 | 25,36 | 26,63 | 33,03 | 30,09 | 30% | 11,97 |
| Atrox 40, tabl. powl., 40 mg | 90 szt. | 5907695215373 | 36,63 | 38,46 | 46,81 | 45,14 | 30% | 15,21 |
| Corator, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991150914 | 7,14 | 7,50 | 8,80 | 3,76 | 30% | 6,17 |
| Corator, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991151010 | 12,04 | 12,64 | 15,09 | 7,52 | 30% | 9,83 |
| Corator, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991151119 | 20,49 | 21,51 | 25,61 | 15,05 | 30% | 15,08 |
| Lambrinex, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 5909990905508 | 4,86 | 5,10 | 6,40 | 3,76 | 30% | 3,77 |
| Lambrinex, tabletki powlekane, 10 mg | 60 tabl. | 5909990905539 | 6,16 | 6,47 | 8,92 | 7,52 | 30% | 3,66 |
| Lambrinex, tabletki powlekane, 10 mg | 90 tabl. | 5909990905553 | 9,23 | 9,69 | 13,12 | 11,28 | 30% | 5,22 |
| Lambrinex, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 5909990905638 | 7,77 | 8,16 | 10,61 | 7,52 | 30% | 5,35 |
| Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg | 60 tabl. | 5909990905652 | 12,31 | 12,93 | 17,03 | 15,05 | 30% | 6,50 |
| Lambrinex, tabletki powlekane, 20 mg | 90 tabl. | 5909990905676 | 18,36 | 19,28 | 24,68 | 22,57 | 30% | 8,88 |
| Lambrinex, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. | 5909990905782 | 15,53 | 16,31 | 20,41 | 15,05 | 30% | 9,88 |
| Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg | 60 tabl. | 5909990905805 | 24,47 | 25,69 | 32,09 | 30,09 | 30% | 11,03 |
| Lambrinex, tabletki powlekane, 40 mg | 90 tabl. | 5909990905867 | 36,72 | 38,56 | 46,91 | 45,14 | 30% | 15,31 |
| Larus, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078530 | 6,19 | 6,50 | 7,80 | 3,76 | 30% | 5,17 |
| Larus, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078707 | 6,66 | 6,99 | 9,44 | 7,52 | 30% | 4,18 |
| Larus, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078790 | 19,04 | 19,99 | 24,09 | 15,05 | 30% | 13,56 |
| Storvas CRT, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. | 5909991042097 | 4,15 | 4,36 | 5,66 | 3,76 | 30% | 3,03 |
| Storvas CRT, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 5909991042103 | 8,19 | 8,60 | 11,05 | 7,52 | 30% | 5,79 |
| Storvas CRT, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. | 5909991042134 | 16,58 | 17,41 | 21,51 | 15,05 | 30% | 10,98 |
| Storvas CRT, tabl. powl., 80 mg | 30 szt. | 5909991042141 | 32,83 | 34,47 | 40,87 | 30,09 | 30% | 19,81 |
| Torvacard, tabl. powl., 80 mg | 30 tabl. | 5909990957071 | 39,59 | 41,57 | 47,97 | 30,09 | 30% | 26,91 |
| Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338290 | 7,86 | 8,25 | 9,55 | 3,76 | 30% | 6,92 |
| Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338368 | 11,34 | 11,91 | 14,36 | 7,52 | 30% | 9,10 |

| Nazwa, postać i dawka leku | Opak. | Kod EAN | UCZ [zł] | CHB [zł] | CD [zł] | WLF [zł] | PO | WDŚ [zł] |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|-----|----------|
| Torvacard 40, tabl. powł., 40 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338436 | 19,98 | 20,98 | 25,08 | 15,05 | 30% | 14,55 |
| Torvacard 40, tabl. powł., 40 mg | 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990338443 | 59,94 | 62,94 | 71,29 | 45,14 | 30% | 39,69 |
| Torvalipin, tabl. powł., 10 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990053179 | 7,29 | 7,65 | 8,95 | 3,76 | 30% | 6,32 |
| Torvalipin, tabl. powł., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990053230 | 11,34 | 11,91 | 14,36 | 7,52 | 30% | 9,10 |
| Torvalipin, tabl. powł., 40 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990053278 | 19,44 | 20,41 | 24,51 | 15,05 | 30% | 13,98 |
| Tulip, tabl. powł., 10 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990998814 | 7,99 | 8,39 | 9,69 | 3,76 | 30% | 7,06 |
| Tulip, tabl. powł., 10 mg | 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990998821 | 15,98 | 16,78 | 19,23 | 7,52 | 30% | 13,97 |
| Tulip, tabl. powł., 10 mg | 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990998838 | 23,76 | 24,95 | 28,38 | 11,28 | 30% | 20,48 |
| Tulip, tabl. powł., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990998913 | 12,96 | 13,61 | 16,06 | 7,52 | 30% | 10,80 |
| Tulip, tabl. powł., 20 mg | 60 szt. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990998920 | 23,22 | 24,38 | 28,48 | 15,05 | 30% | 17,95 |
| Tulip, tabl. powł., 20 mg | 90 szt. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990998937 | 34,02 | 35,72 | 41,12 | 22,57 | 30% | 25,32 |
| Tulip 40 mg, tabl. powł., 40 mg | 30 szt. | 5909990810161 | 16,42 | 17,24 | 21,34 | 15,05 | 30% | 10,81 |
| Tulip 40 mg, tabl. powł., 40 mg | 60 tabl. | 5909990810178 | 27,71 | 29,10 | 35,50 | 30,09 | 30% | 14,44 |
| Tulip 40 mg, tabl. powł., 40 mg | 90 tabl. | 5909990810185 | 41,55 | 43,63 | 51,98 | 45,14 | 30% | 20,38 |
| Tulip 80 mg, tabl. powł., 80 mg | 30 szt. | 5909990810208 | 43,20 | 45,36 | 51,76 | 30,09 | 30% | 30,70 |
| Lovastatinum | | | | | | | | |
| Liprox, tabl., 20 mg | 28 szt. | 5909990842315 | 12,85 | 13,49 | 14,57 | 3,12 | 30% | 12,39 |
| Lovasterol, tabl., 20 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990422159 | 13,93 | 14,63 | 15,71 | 3,12 | 30% | 13,53 |
| Lovastin, tabl., 20 mg | 28 szt. | 5909990756629 | 11,99 | 12,59 | 13,67 | 3,12 | 30% | 11,49 |
| Simvastatinum | | | | | | | | |
| Apo-Simva 10, tabl. powł., 10 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990618279 | 6,43 | 6,75 | 7,62 | 2,51 | 30% | 5,86 |
| Apo-Simva 20, tabl. powł., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990618286 | 11,39 | 11,96 | 13,69 | 5,02 | 30% | 10,18 |
| Apo-Simva 40, tabl. powł., 40 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990618293 | 18,90 | 19,85 | 22,95 | 10,03 | 30% | 15,93 |

| Nazwa, postać i dawka leku | Opak. | Kod EAN | UCZ [zł] | CHB [zł] | CD [zł] | WLF [zł] | PO | WDŚ [zł] |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|-----|----------|
| Simcovas, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990649532 | 6,05 | 6,35 | 7,97 | 4,68 | 30% | 4,69 |
| Simcovas, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. | 5909991048488 | 2,38 | 2,50 | 4,22 | 4,22 | 30% | 1,27 |
| Simcovas, tabl. powl., 40 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990649655 | 12,10 | 12,71 | 15,64 | 9,36 | 30% | 9,09 |
| Simcovas, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. | 5909991048495 | 4,75 | 4,99 | 8,09 | 8,09 | 30% | 2,43 |
| Simorion, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. | 5909990793853 | 3,62 | 3,80 | 4,61 | 2,34 | 30% | 2,97 |
| Simorion, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. | 5909990794140 | 5,94 | 6,24 | 7,86 | 4,68 | 30% | 4,58 |
| Simorion, tabl. powl., 20 mg | 98 szt. | 5909990794157 | 18,36 | 19,28 | 23,61 | 16,38 | 30% | 12,14 |
| Simorion, tabl. powl., 40 mg | 28 szt. | 5909990794089 | 10,80 | 11,34 | 14,27 | 9,36 | 30% | 7,72 |
| Simratio 10, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991019723 | 5,94 | 6,24 | 7,05 | 2,34 | 30% | 5,41 |
| Simratio 20, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991019822 | 11,88 | 12,47 | 14,09 | 4,68 | 30% | 10,81 |
| Simratio 40, tabl. powl., 40 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991019945 | 22,68 | 23,81 | 26,74 | 9,36 | 30% | 20,19 |
| Simvacard 10, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990940110 | 5,86 | 6,15 | 6,96 | 2,34 | 30% | 5,32 |
| Simvacard 20, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990940219 | 10,80 | 11,34 | 12,96 | 4,68 | 30% | 9,68 |
| Simvacard 40, tabl. powl., 40 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990940318 | 22,03 | 23,13 | 26,06 | 9,36 | 30% | 19,51 |
| Simvachol, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990941025 | 3,67 | 3,85 | 4,65 | 2,34 | 30% | 3,01 |
| Simvachol, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990941124 | 7,34 | 7,71 | 9,33 | 4,68 | 30% | 6,05 |
| Simvachol, tabl. powl., 40 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990941223 | 14,69 | 15,42 | 18,35 | 9,36 | 30% | 11,80 |
| Simvacor, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990336623 | 5,40 | 5,67 | 6,54 | 2,51 | 30% | 4,78 |
| Simvacor, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990336630 | 10,80 | 11,34 | 13,07 | 5,02 | 30% | 9,56 |
| Simvagama 10, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991146016 | 4,10 | 4,31 | 5,18 | 2,51 | 30% | 3,42 |
| Simvagama 20, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991146115 | 8,10 | 8,51 | 10,24 | 5,02 | 30% | 6,73 |
| Simvagama 40, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991146214 | 17,82 | 18,71 | 21,81 | 10,03 | 30% | 14,79 |
| Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743650 | 5,35 | 5,62 | 7,24 | 4,68 | 30% | 3,96 |

| Nazwa, postać i dawka leku | Opak. | Kod EAN | UCZ [zł] | CHB [zł] | CD [zł] | WLF [zł] | PO | WDŚ [zł] |
|--|------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|-----|----------|
| Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743667 | 10,69 | 11,22 | 14,15 | 9,36 | 30% | 7,60 |
| SimvaHEXAL 10, tabl. powł., 10 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623273 | 6,32 | 6,64 | 7,51 | 2,51 | 30% | 5,75 |
| SimvaHEXAL 20, tabl. powł., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623297 | 12,64 | 13,27 | 15,00 | 5,02 | 30% | 11,49 |
| SimvaHEXAL 40, tabl. powł., 40 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623334 | 21,60 | 22,68 | 25,78 | 10,03 | 30% | 18,76 |
| Simvastatin Bluefish, tabl. powł., 10 mg | 28 szt. | 5909990723591 | 3,02 | 3,17 | 3,99 | 2,34 | 30% | 2,35 |
| Simvastatin Bluefish, tabl. powł., 20 mg | 28 szt. | 5909990723812 | 4,32 | 4,54 | 6,16 | 4,68 | 30% | 2,88 |
| Simvastatin Bluefish, tabl. powł., 20 mg | 30 szt. | 5909990723829 | 4,54 | 4,77 | 6,50 | 5,02 | 30% | 2,99 |
| Simvastatin Bluefish, tabl. powł., 40 mg | 28 szt. | 5909990724031 | 8,64 | 9,07 | 12,00 | 9,36 | 30% | 5,45 |
| Simvastatin Genoptim, tabl. powł., 20 mg | 28 szt. | 5907553016012 | 4,75 | 4,99 | 6,61 | 4,68 | 30% | 3,33 |
| Simvastatin Genoptim, tabl. powł., 40 mg | 28 szt. | 5907553016029 | 8,64 | 9,07 | 12,00 | 9,36 | 30% | 5,45 |
| Simvastatinum Accord, tabl. powł., 10 mg | 100 szt. | 5909990706464 | 3,60 | 3,78 | 6,45 | 6,45 | 30% | 1,94 |
| Simvastatinum Accord, tabl. powł., 10 mg | 28 szt. | 5909990706396 | 1,07 | 1,12 | 1,93 | 1,93 | 30% | 0,58 |
| Simvastatinum Accord, tabl. powł., 10 mg | 30 szt. | 5909990706402 | 1,07 | 1,12 | 1,99 | 1,99 | 30% | 0,60 |
| Simvastatinum Accord, tabl. powł., 20 mg | 100 szt. | 5909990706594 | 7,19 | 7,55 | 11,94 | 11,94 | 30% | 3,58 |
| Simvastatinum Accord, tabl. powł., 20 mg | 28 szt. | 5909990706532 | 2,15 | 2,26 | 3,88 | 3,88 | 30% | 1,16 |
| Simvastatinum Accord, tabl. powł., 20 mg | 30 szt. | 5909990706549 | 2,15 | 2,26 | 3,99 | 3,99 | 30% | 1,20 |
| Simvastatinum Accord, tabl. powł., 40 mg | 100 szt. | 5909990706693 | 14,40 | 15,12 | 21,95 | 21,95 | 30% | 6,59 |
| Simvastatinum Accord, tabl. powł., 40 mg | 28 szt. | 5909990706631 | 4,31 | 4,53 | 7,46 | 7,46 | 30% | 2,24 |
| Simvastatinum Accord, tabl. powł., 40 mg | 30 szt. | 5909990706648 | 4,31 | 4,53 | 7,63 | 7,63 | 30% | 2,29 |
| Simvasterol, tabl. powł., 10 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990927616 | 6,05 | 6,35 | 7,16 | 2,34 | 30% | 5,52 |
| Simvasterol, tabl. powł., 20 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990927715 | 12,10 | 12,71 | 14,33 | 4,68 | 30% | 11,05 |
| Simvasterol, tabl. powł., 40 mg | 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990927838 | 24,19 | 25,40 | 28,33 | 9,36 | 30% | 21,78 |
| Sistat, tabl. powł., 10 mg | 28 szt. | 5909991261139 | 0,99 | 1,04 | 1,85 | 1,85 | 30% | 0,56 |
| Sistat, tabl. powł., 20 mg | 28 szt. | 5909991261184 | 1,99 | 2,09 | 3,72 | 3,72 | 30% | 1,12 |
| Sistat, tabl. powł., 40 mg | 28 szt. | 5909991261238 | 3,99 | 4,19 | 7,12 | 7,12 | 30% | 2,14 |
| Vasilip, tabl. powł., 10 mg | 28 szt. | 5909990914012 | 5,29 | 5,55 | 6,36 | 2,34 | 30% | 4,72 |

| Nazwa, postać i dawka leku | Opak. | Kod EAN | UCZ [zł] | CHB [zł] | CD [zł] | WLF [zł] | PO | WDŚ [zł] |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Vasilip, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. | 5909990914111 | 11,72 | 12,31 | 13,93 | 4,68 | 30% | 10,65 |
| Vasilip, tabl. powl., 40 mg | 28 szt. | 5909990982714 | 18,25 | 19,16 | 22,09 | 9,36 | 30% | 15,54 |
| Vastan, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991073114 | 5,27 | 5,53 | 6,34 | 2,34 | 30% | 4,70 |
| Vastan, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991073213 | 10,67 | 11,20 | 12,82 | 4,68 | 30% | 9,54 |
| Ximve, tabl. powl., 10 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990935116 | 5,83 | 6,12 | 6,99 | 2,51 | 30% | 5,23 |
| Ximve, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990055722 | 10,69 | 11,22 | 12,84 | 4,68 | 30% | 9,56 |
| Ximve, tabl. powl., 20 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990935215 | 11,45 | 12,02 | 13,75 | 5,02 | 30% | 10,24 |
| Ximve, tabl. powl., 40 mg | 30 szt. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990935314 | 19,01 | 19,96 | 23,06 | 10,03 | 30% | 16,04 |
| Zocor 10, tabl. powl., 10 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990365913 | 9,50 | 9,98 | 10,79 | 2,34 | 30% | 9,15 |
| Zocor 20, tabl. powl., 20 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990366026 | 15,52 | 16,30 | 17,92 | 4,68 | 30% | 14,64 |
| Zocor 40, tabl. powl., 40 mg | 28 szt. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990769124 | 23,98 | 25,18 | 28,10 | 9,36 | 30% | 21,55 |
| Rapamune, tabl. draż., 1 mg | 30 szt. | 5909990985210 | 461,47 | 484,54 | 509,15 | 509,15 | ryczałt | 3,20 |
| Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml | 60 ml (but.+30 strzyk.) | 5909990893645 | 937,18 | 984,04 | 1020,77 | 1018,30 | ryczałt | 5,67 |

Skróty: UCZ – urzędowa cena zbytu, CHB – cena hurtowa brutto, CD – cena detaliczna, WLF – Wysokość limitu finansowania, PO – poziom odpłatności, WDŚ – wysokość dopłaty świadczeniobiorcy

5.2. Strategia wyszukiwania publikacji

Tabela 3. Strategia wyszukiwania w bazie Medline (data ostatniego wyszukiwania: 30.11.2018 r.)

| Nr wyszukiwania | Kwerenda | Liczba rekordów |
|-----------------|---|-----------------|
| #19 | Search (#11 AND #12 AND #13) Filters: Publication date from 2015/01/05 to 2018/11/30; Child: birth-18 years | 1 |
| #18 | Search (#11 AND #12 AND #13) | 857 |
| #17 | Search (#15 AND #16) | 33 |
| #16 | Search (child OR children OR adolescent* OR juvenile* OR youth OR pediatric) | 3647953 |
| #15 | Search (#11 AND #12 AND #13) | 857 |
| #13 | Search (secondary OR acquired) | 1312751 |
| #12 | Search (#8 OR #9 OR #10) | 288803 |
| #11 | Search (#2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7) | 20913 |
| #10 | Search cholesterol[MeSH Terms] | 153320 |
| #9 | Search hypercholesterolemia[MeSH Terms] | 24858 |

| Nr wyszukiwania | Kwerenda | Liczba rekordów |
|-----------------|--|-----------------|
| #8 | Search (hypercholesterolemia OR hipercholesterolemia OR hypercholesterolaemia IR hipercholesterolaemia OR cholesterol) | 288803 |
| #7 | Search simvastatin[MeSH Terms] | 7276 |
| #6 | Search atorvastatin[Supplementary Concept] | 0 |
| #5 | Search lovastatin[MeSH Terms] | 10552 |
| #4 | Search lovastatin[Supplementary Concept] | 4452 |
| #3 | Search simvastatin[Supplementary Concept] | 7259 |
| #2 | Search (atorvastatin or lovastatin or simvastatin) | 20913 |

Tabela 4. Strategia wyszukiwania w bazie Embase (data ostatniego wyszukiwania: 30.11.2018r.)

| Nr wyszukiwania | Kwerenda | Liczba rekordów |
|-----------------|---|-----------------|
| 1 | (atorvastatin or simvastatin or lovastatin).mp. [mp=title, abstract, heading word, drug trade name, original title, device manufacturer, drug manufacturer, device trade name, keyword] | 58529 |
| 2 | exp atorvastatin/ | 34004 |
| 3 | exp simvastatin/ | 33690 |
| 4 | exp lovastatin/ | 12595 |
| 5 | 1 or 2 or 3 or 4 | 61216 |
| 6 | (hypercholesterolemia or hipercholesterolemia or hypercholesterolaemia or hipercholesterolaemia or cholesterol).mp. [mp=title, abstract, heading word, drug trade name, original title, device manufacturer, drug manufacturer, device trade name, keyword] | 336791 |
| 7 | exp hypercholesterolemia/ | 53932 |
| 8 | exp cholesterol/ | 230417 |
| 9 | 6 or 7 or 8 | 337807 |
| 10 | (secondary or acquired).mp. [mp=title, abstract, heading word, drug trade name, original title, device manufacturer, drug manufacturer, device trade name, keyword] | 1072659 |
| 11 | 5 and 9 and 10 | 3185 |
| 12 | limit 11 to (school child <7 to 12 years> or adolescent <13 to 17 years>) | 28 |
| 13 | (child or children or adolescent\$ or juvenile\$ or youth or pediatric).mp. [mp=title, abstract, heading word, drug trade name, original title, device manufacturer, drug manufacturer, device trade name, keyword] | 2311358 |
| 14 | 5 and 9 and 10 and 13 | 82 |
| 15 | limit 14 to yr="2015 - 2018" | 15 |

Tabela 5. Strategia wyszukiwania w bazie Cochrane (data ostatniego wyszukiwania: 30.11.2018 r.)

| Nr wyszukiwania | Kwerenda | Liczba rekordów |
|-----------------|--|-----------------|
| #1 | MeSH descriptor: [Lovastatin] explode all trees | 1958 |
| #2 | MeSH descriptor: [Simvastatin] explode all trees | 1611 |
| #3 | atorvastatin or lovastatin or simvastatin:ti,ab,kw (Word variations have been searched) | 7201 |
| #4 | Enter terms for search #1 or #2 or #3 | 1958 |
| #5 | Enter terms for search hypercholesterolemia or hipercholesterolemia or hypercholesterolaemia or hipercholesterolaemia or cholesterol | 30991 |
| #6 | MeSH descriptor: [Hypercholesterolemia] explode all trees | 3080 |
| #7 | MeSH descriptor: [Cholestero] explode all trees | 9716 |
| #8 | Enter terms for search #5 or #6 or #7 | 30988 |
| #9 | Enter terms for search secondary or acquired | 122836 |
| #10 | Enter terms for search child or children or adolescent* or juvenile* or youth or pediatric | 221903 |

| Nr wyszukiwania | Kwerenda | Liczba rekordów |
|-----------------|--|-----------------|
| #11 | Enter terms for search #4 and #8 and #9 and #10 with Cochrane L brary publication date from Jan 2015 to Nov 2018 | 1 |