

Posiedzenie Rady Przejrzystości 42/2019 w dniu 21.10.2019 r.

Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku **Cabometyx (cabozantinibum)** w ramach programu lekowego: „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)”.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „**Profilaktyka wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych na lata 2020-2022**” (woj. zachodniopomorskie).

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „**Program polityki zdrowotnej - wczesnego wykrywania raka jelita grubego na lata 2020-2022**” (miasto Kalisz)

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

1. **Opdivo (nivolumab)** we wskazaniu: chłoniak Hodgkina NS (ICD-10: C81.1) u pacjenta, u którego nie przeprowadzono wcześniej procedury ASCT,
2. **Keytruda (pembrolizumab)** we wskazaniach: nawracający i oporny chłoniak szarej strefy o cechach pośrednich pomiędzy DLBCL a klasycznym chłoniakiem Hodgkina. Chłoniak śródpiersia (ICD-10: C85.9),
3. **Keytruda (pembrolizumab)** we wskazaniu: glejak wielopostaciowy (ICD-10: 71.9),
4. **Avastin (bewacyzumab)** we wskazaniu: glejak wielopostaciowy (ICD-10: 71.9).

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „**Proteza całkowita górna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach. Proteza całkowita dolna o charakterze overdenture oparta na zabezpieczonych korzeniach.**” jako świadczenia gwarantowanego.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

- **spironolactonum** we wskazaniu: pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory,
- **bisoprololum** we wskazaniu: tachyarytmie nadkomorowe – u pacjentów powyżej 6 r. ż.,
- **chlorambucilum** we wskazaniu: amyloidoza,
- **mycophenolas mofetil** we wskazaniach: choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego,
- **amoxicillinum** we wskazaniu: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka,
- **amoxicillinum + acidum clavulanicum** we wskazaniu: zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności – profilaktyka,
- **sulfamethoxazolum+trimethoprimum** we wskazaniu: zakażenia u pacjentów leczonych cuklofosfamidem – profilaktyka,
- **diclofenacum** we wskazaniu: ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL,
- **tacrolimusum** we wskazaniach: idiopatyczny zespół nerczycowy – w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek – w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę,
- **sirolimusum** we wskazaniu: cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach.