

## Posiedzenie Rady Przejrzystości 19/2022 w dniu 16.05.2022 r.

### Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie **technologii lekowych ocenianych pod kątem uwzględnienia na liście technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności.**

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

- **Tysabri (natalizumab)** w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35) natalizumabem podawanym dożylnie”,
- **Tysabri (natalizumab)** w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35) natalizumabem podawanym podskórnie”,
- **Granulox (hemoglobina w sprayu)** we wskazaniu: leczenie ran przewlekłych, takich jak: owrzodzenia żyłne kończyn dolnych, owrzodzenia tętnicze kończyn dolnych, owrzodzenie mieszane kończyn dolnych, owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, wtórne gojenie ran pooperacyjnych, odleżyny; leczenie ran z martwicą rozplywną i zakażone po odpowiednim leczeniu.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: **„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026”.**

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

- **carbamazepinum** we wskazaniu: neuralgia i ból neuropatyczny inne niż określone w ChPL,
- **lakozamid** we wskazaniu: terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (ICD-10: C96.2),
- **posaconazolum** we wskazaniach: przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych; zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego, przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych z nietolerancją na flukonazol lub/i itrakonazol, zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci powyżej 13 r.ż. przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci powyżej 13 r.ż. z nietolerancją flukonazolu lub/i itrakonazolu - wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego,
- **capecitabinum** we wskazaniu: nowotwór złośliwy trzustki w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną (ICD-10: C25),
- **sunitynibum** we wskazaniu: leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49): mięsak pęcherzykowaty (alveolar soft part sarcoma) w stadium miejscowego zaawansowania lub

uogólnienia przy braku możliwości radykalnego leczenia chirurgicznego u pacjentów w wieku 18 lat i powyżej,

- **peginterferonum alfa-2a** we wskazaniu: C92.1 przewlekła białaczka szpikowa.