

Posiedzenie Rady Przejrzystości 11/2025 w dniu 17.03.2025 r.

Porządek obrad obejmuje:

1. Przygotowanie opinii nt. umieszczenia leków zawierających substancje czynne: **anastrozol, dazatinib, deferazyroks, defibrotyd, eksemestan, erybulina, etopozyd (w postaci doustnej), letrozol, nab-paklitaksel, ramucyrumab, regorafenib, topotekan (w postaci doustnej), tretynoina, winblastyna, winflunina**, wymagających stosowania dłużej niż 30 dni, rekomendowanych w wytycznych postępowania klinicznego, dla których nie złożono wniosku o objęcie refundacją i upłynęła wyłączność rynkową, na liście o której mowa w art. 30a ustawy o refundacji leków.
2. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku **Briumvi (ublituximabum)** w ramach programu lekowego B.29. „Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane (ICD-10: G35)”.
3. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego **„Profilaktyka zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat na terenie gminy Miasto Józefów na lata 2025-2026”**.
4. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego **„Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Brzeg na lata 2025-2028”**.
5. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego **„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w powiecie piaseczyńskim na lata 2025-2027”**.
6. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestacyjnych dla produktów leczniczych zawierających połączenie substancji czynnych **sulfamethoxazol + trimethoprim** we wskazaniu: zakażenia u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka.
7. Przygotowanie opinii w sprawie zasadności kontynuacji refundacji we wskazaniach pozarejestacyjnych dla produktów leczniczych zawierających połączenie substancji czynnych **netupitant + palonosetron** we wskazaniu: wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem antybiotyku z grupy antracyklin i cyklofosfamidu – profilaktyka.