

Posiedzenie Rady Przejrzystości 33/2025 w dniu 04.08.2025 r.

Porządek obrad obejmuje:

1. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku **Staloral 300 (mieszanki wyciągów alergenowych)** we wskazaniu: schorzenia alergiczne (typ I alergii wg klasyfikacji Gella i Coombsa), wywołane przez alergeny pyłków roślin, objawiające się nieżytem nosa, zapaleniem spojówek, nieżytem nosa i spojówek lub astmą (łagodną do umiarkowanej) u dzieci i młodzieży od ukończonego 5. Roku życia do ukończonego 18. roku życia.
2. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku **Pluvicto (lutetii (177Lu) vipivotidi tetraxetanum)** w ramach programu lekowego B.56. „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”.
3. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku **Oralair 100 IR & 300 IR (wyciąg alergenów z pyłków traw)** we wskazaniu: leczenie dzieci (od 5 roku życia), młodzieży oraz dorosłych (do 65 roku życia), u których zdiagnozowano alergiczny nieżyt nosa z lub bez zapalenia spojówek, na podstawie objawów klinicznych oraz dodatniego wyniku punktowego testu skórniego i/lub obecności swoistych IgE w surowicy skierowanego przeciw pyłkowi jednej z traw z grupy homologicznej traw wiechlinowatych (Pooideae).
4. Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego „**Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji, fizykoterapii i fizjoterapii dla mieszkańców Gminy Kodrąb na lata 2025-2027**”.
5. Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej **arsenicum trioxidum** we wskazaniu: C.65.b. (C92.4 ostra białaczka promielocytowa w przypadku: pacjentów poniżej 18 roku życia z rozpoznaniem ostrej białaczki promielocytowej charakteryzującej się translokacją t(15;17) i (lub) obecnością genu PML/RAR-alfa).
6. Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej **mycophenolas mofetil** we wskazaniach:
 - choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności;
 - cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego.
7. Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej **sirolimusum** we wskazaniu: cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego -

oporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach
niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach