



**Rada Przejrzystości**  
działająca przy  
**Prezese Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**

**Protokół nr 42/2016**  
**z posiedzenia Rady Przejrzystości**  
**w dniu 28 listopada 2016 roku**  
**w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)**

Członkowie Rady Przejrzystości, wylosowanego Zespołu (Rada), obecni na posiedzeniu:

1. Marzanna Bieńkowska
2. Paweł Grieb
3. Lucjusz Jakubowski
4. Agata Maciejczyk
5. Aleksandra Michowicz
6. Michał Myśliwiec
7. Tomasz Pasierski – prowadził posiedzenie
8. Rafał Suwiński
9. Andrzej Śliwczyński

Członkowie Rady Przejrzystości, nieobecni na posiedzeniu:

1. Zbigniew Szawarski

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie konfliktów interesów członków Rady.
4. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku BLINCYTO (blinatumomab) we wskazaniu: leczenie w ramach programu lekowego „Leczenie blinatumomabem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B bez chromosomu Filadelfia w przypadku wznowy lub oporności na wcześniejszą terapię (ICD-10 C91.0)”.
5. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku LIXIANA (edoksaban) we wskazaniu: leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych.
6. Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku NUCALA (mepolizumab) we wskazaniu: leczenie w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy eozynofilowej mepolizumabem (ICD-10 J45)”.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1.** Posiedzenie o godzinie 11.00 otworzył Przewodniczący Rady Tomasz Pasierski.



**Ad 2.** Prowadzący poinformował członków Rady o konieczności poszerzenia porządku obrad o punkt dotyczący korekty opinii, wydanych podczas posiedzenia Rady w dniu 21 listopada br., w sprawie objęcia refundacją leków, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Rada przyjęła jednogłośnie propozycję zmiany porządku obrad zaproponowaną przez Tomasza Pasierskiego.

**Ad 4.** Z powodów technicznych, w oczekiwaniu na uruchomienie sieci komputerowej i przedstawienie prezentacji, Rada postanowiła na wstępie wysłuchać propozycji projektu stanowiska przedstawionego przez Rafała Suwińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady.

Rafał Suwiński przedstawiając projekt pozytywnego stanowiska zwrócił uwagę na fakt, że omawiany lek ma być stosowany u chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną, która nieleczona prowadzi do śmierci. Stwierdził, że problemem głównie dotyczącym tego leku jest to, że badanie o największej wiarygodności zostało opublikowane tylko w formie streszczenia zjazdowego. Są jednak przynajmniej dwie inne publikacje pełnotekstowe, zamieszczone w dobrych czasopismach, ale dotyczące badań II fazy. Jego zdaniem lek na pewno wykazuje skuteczność w odniesieniu do odpowiedzi na leczenie, w tym również pozwala u części chorych na uzyskanie całkowitej remisji, co jest niezmiernie istotne w takiej grupie chorych, u których wcześniej już leczenie było stosowane i u których okazało się nieskuteczne. Jest to istotne ponieważ po uzyskaniu całkowitej remisji można próbować po raz kolejny podejmować przeszczepienie szpiku. Przynajmniej jedno z tych badań II fazy, w którym było ponad 180 chorych pokazuje, że taki ponowny przeszczep jest możliwy u 17% chorych, więc jest to klinicznie istotna liczba. Co więcej 30% chorych przeżywa 1 rok i prawdopodobnie niewielki, ale jednak powtarzalny odsetek chorych, u których możliwe było dokonanie alloprzeszczepu, będzie żył dłużej.

Dodał, że lek wykazuje sporą toksyczność, a poważne działania niepożądane są udziałem znacznego odsetka chorych, co jest typowe dla leczenia tak poważnej choroby, zwłaszcza w przypadku gdy poprzednie linie leczenia okazały się nieskuteczne. Rozważając wszystkie za i przeciw, zaproponował opinię pozytywną. Ponieważ efektywność kosztowa leku jest niezadowolająca, proponuje aby Rada nie akceptując proponowanego instrumentu dzielenia ryzyka zaproponowała, by technologię ocenić ponownie w momencie, kiedy ukażą się wyniki badania III fazy. Jego zdaniem we wnioskowanym programie należy doprecyzować kryteria, na podstawie których stwierdza się progresję choroby wykluczającą udział pacjenta w programie.

Następnie analityk AOTMiT, na podstawie prezentacji, przedstawił najistotniejsze informacje z analizy weryfikacyjnej nr: OT.4351.32.2016 „Wniosek o objęcie refundacją leku Blincyto (blinatumomab) w ramach programu lekowego: »Leczenie blinatumomabem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B bez chromosomu Filadelfia w przypadku wznowy lub oporności na wcześniejszą terapię (ICD-10 C91.0)«”.

Analityk zauważył m.in., że u leczonych blinatumomabem uzyskuje się wydłużenie przeżycia całkowitego, co można stwierdzić porównując mediany przeżycia u leczonych blinatumomabem (ok. 6 mies.) i chemioterapią standardową (nieco ponad 3 mies.) w opublikowanych badaniach jednoramiennych. Rafał Suwiński zwrócił uwagę, że w takich technologiach mediana nie jest dobrym miernikiem [efektu klinicznego], gdyż w tego typu lekach zysk z leczenia odnosi mniej niż połowa chorych, dotyczy to również immunoterapii, trzeba więc patrzeć na całość przebiegu krzywych przeżycia, a zwłaszcza na ten „ogon” – chorych, którzy żyją dłużej. W omawianym przypadku, patrząc na dane [krzywe Kaplana-Meiera z badań II fazy – przyp. red.], wydaje się, że u kilkunastu procent chorych udaje się uzyskać wielomiesięczne, a być może nawet kilkuletnie przeżycie, czy też wyleczenie.

Ponieważ według informacji uzyskanej od analityka, żaden z ekspertów klinicznych, do których AOTMiT zwróciła się z prośbą o wydanie opinii na temat omawianego leku, nie odpowiedział, Tomasz Pasierski

osobiście zatelefonował do Konsultanta Krajowego w dziedzinie hematologii prof. Wiesława Jędrzejczaka.

W międzyczasie Michał Myśliwiec zgłosił swoje wątpliwości, przypominając, że członkowie Rady wielokrotnie dyskutowali na temat nieopierania się przy wydawaniu opinii na abstraktach, ponieważ nie są one przez nikogo weryfikowane. Badanie z grupą kontrolną ukazało się w kwietniu br. i jego zdaniem, gdyby było to coś ważnego, to publikacja pełnotekstowa powinna się już ukazać w dobrym czasopiśmie.

Kontynuując - z powodu złej jakości połączenia - Tomasz Pasierski przekazał osobiście członkom Rady treść opinii W. Jędrzejczaka, który stwierdził, że zastosowanie leku jest niszowe, choroba u osób dorosłych występuje stosunkowo rzadko i w Polsce jest to nie więcej niż 50 osób rocznie, a jego doświadczenie z lekiem jest pojedyncze i stosował go na koszt fundacji. Generalnie doświadczenie jest pozytywne, bo lek wprawdzie nie leczy choroby, ale jest bardzo pomocny przy transplantacji szpiku kostnego.

Tomasz Pasierski dodał, że dotychczas Rada nie rekomendowała leku, który miałby tylko abstrakt zjazdowy, i jeśli wyda pozytywną opinię, to zrobi pewne ustępstwo.

W odpowiedzi Rafał Suwiński zauważył, że gdyby abstrakt był jedynym badaniem dotyczącym tego leku, to on też by proponował stanowisko negatywne, ale są dwa badania II fazy, z czego jedno na dużej licznie grupie chorych, i w projekcie stanowiska odniósł się do badań II fazy, a nie do abstraktu, który jest niewiarygodny. Obecnie jest dużo leków, które zostały zarejestrowane na podstawie badań II fazy, i najczęściej dotyczą one technologii, które wydają się ponadprzeciętnie skuteczne w porównaniu z tym, co jest dostępne, jak np. w onkologii leki ukierunkowane molekularnie, dlatego uważa, że należy powrócić do oceny leku wówczas, gdy będą dostępne badania III fazy.

Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych Wojciech Wysoczański wtrącił, że w takim przypadku dobrym rozwiązaniem są RSS-y, a do czasu uzyskania wyników badań refundowany powinien być jedynie koszt terapii u pacjentów osiągających całkowitą remisję.

Andrzej Śliwczyński stwierdził, że lek może być obiecujący, ale jego zdaniem podany w analizach czas przeżycia jest mocno przeszacowany, gdyby lek miał być finansowany pod warunkiem uzyskania efektu zdrowotnego, to Rada powinna określić, jaki ten efekt zdrowotny powinien być.

Rafał Suwiński jako kryterium efektywności uznał uzyskanie całkowitej remisji.

Tomasz Pasierski stwierdził, że początkowo był przeciwny refundacji, ale propozycja refundowania leku pod warunkiem takiego RSS, w którym NFZ poniesie koszty jedynie za tych chorych, którzy osiągną remisję w wyniku stosowania tego leku, skłoniła go do zmiany zdania.

Andrzej Śliwczyński zwrócił uwagę, że takie rozwiązania były już proponowane przez Radę w rekomendacjach, ale ani Komisja Ekonomiczna, ani Minister Zdrowia nie uzyskali dotychczas żadnej zgody na to, aby przesłanką do finansowania był określony efekt zdrowotny; na dzień dzisiejszy nie ma takich RSS-ów i wydaje mu się, że również i ta firma na taki RSS się nie zgodzi.

Po ostatecznym sformułowaniu treści stanowiska Rady, prowadzący zarządził głosowanie. Rada 9 głosami za projektem stanowiska, przy 0 głosów przeciw projektowi, przyjęła uchwałę, będącą jej stanowiskiem, która stanowi załącznik do protokołu.

**Ad 3.** Prowadzący posiedzenie Tomasz Pasierski zapytał członków Rady o ewentualny konflikt interesów - nikt takiego nie zgłosił. Następnie oświadczył, że wprawdzie nie posiada ustawowego konfliktu interesów, chciałby jednak oficjalnie zgłosić fakt prowadzenia dla firmy Amgen badań, nad lekiem innym niż omawiany przed chwilą Blinkyto, o czym zapomniał poinformować członków Rady



wcześniej. W związku z powyższym, składa w tej chwili wniosek o wyrażenie zgody na udział w głosowaniu, w sprawie objętej 4 pkt. porządku obrad. Rada jednomyślnie zaaprobowała fakt wzięcia udziału w głosowaniu przez Tomasza Pasierskiego.

**Ad 5.** Analityk AOTMIT, na podstawie prezentacji, przedstawił najistotniejsze informacje z analizy weryfikacyjnej nr: OT.4350.19.2016 „Wniosek o objęcie refundacją leku Lixiana (edoksaban) we wskazaniu: »Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych«”.

Następnie swoją propozycję stanowiska przedstawił Michał Myśliwiec, Wiceprzewodniczący Rady wyznaczony przez prowadzącego posiedzenie do przygotowania projektu stanowiska. Edoksaban ma, jego zdaniem, znacznie lepsze dowody naukowe niż istniejące obecnie na polskim rynku dabigatran i rywaroksaban. Istnieje jednak problem polegający na tym, że producent zwraca się o wydawanie go za odpłatnością 30%, ale on nie spełnia warunków finansowych i powinien być według ustawy wydawany bezpłatnie. Osobiście uważa, że byłby to za duży skok, bo są dwa leki od niego droższe i wydawane na 30%, a ten miałby być tańszy i wydawany bezpłatnie. Według niego są dwa wyjścia, albo refundację uznać za zasadną (substancja nie jest droga skoro 30 i 60 mg kosztuje tyle samo), albo przyjąć wariant taki, że edoksaban wchodzi w tę samą grupę co heparyny drobnocząsteczkowe (dabigatran i rywaroksaban), pod warunkiem obniżenia ceny leku do poziomu umożliwiającego wydawanie go pacjentom za odpłatnością 30%, stosownie do ustawy.

Według informacji analityka – przy nowej podstawie limitu, która została wprowadzona z dniem 1 listopada br. lek Lixiana spełnia kryteria kwalifikacji do odpłatności 30%.

W wyniku zarządzanego przez prowadzącego posiedzenie głosowania, Rada przyjęła uchwały będące jej stanowiskami, które stanowią załączniki do protokołu:

- 1) Lixiana (edoxabanum), tabl. powl., 30 mg, 30 szt., kod EAN 5901549325058 - w wyniku głosowania, 9 głosów za projektem stanowiska Rady, 0 głosów przeciw projektowi Rady,
- 2) Lixiana (edoxabanum), tabl. powl., 60 mg, 30 szt., kod EAN 5901549325072 - w wyniku głosowania, 9 głosów za projektem stanowiska Rady, 0 głosów przeciw projektowi Rady.

**Ad 6.** Analityk AOTMIT, na podstawie prezentacji, przedstawił najistotniejsze informacje z analizy weryfikacyjnej nr: OT.4351.31.2016 „Wniosek o objęcie refundacją leku Blincyto (blinatumomab) w ramach programu lekowego: „Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Nucala (mepolizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiej astmy eozynofilowej mepolizumabem (ICD-10 J 82.0)“”.

Następnie swoją propozycję stanowiska przedstawił Lucjusz Jakubowski, członek Rady wyznaczony przez prowadzącego posiedzenie do przygotowania projektu stanowiska. Zaproponował stanowisko negatywne z uwagi na brak efektywności kosztowej, na znikomą w sumie korzyść kliniczną w stosunku do dotychczasowych schematów leczenia czy do leczenia omalizumabem. Stwierdził, że skuteczność terapii jest wprawdzie porównywalna z omalizumabem, jednak porównanie pośrednie można podważyć co do idei, bo nie jest jasne, na ile grupa pacjentów kwalifikowanych do programu leczenia mepolizumabem, chociażby w oparciu o nasz polski program lekowy, jest równorzędna z populacją we wniosku. W publikacjach, także polskich podkreśla się, że duża grupa chorych ze wskazaniem do leczenia omalizumabem może być także kwalifikowana do kodu ICD 10 w zakresie astmy eozynofilowej. Niezależnie od opinii ekspertów, grupy te mogą się nakładać w co najmniej 30%, co to powoduje, że u części pacjentów leczonych omalizumabem są podstawy do rozpoznania astmy eozynofilowej. Co do istoty rozpoznania astmy eozynofilowej i traktowania eozynofilii w krwi jako pewnego punktu końcowego i zmianę w zakresie tej eozynofilii, może też zachodzić pewne nieporozumienie, gdyż wielu autorów zwraca uwagę na fakt, że nie jest to wystarczająco czuły swoisty i wystarczający wskaźnik w



przypadku astmy oskrzelowej, że decyduje tutaj w zasadzie poziom eozynofilii w biopsji oskrzeli. Biopsje oskrzeli są problematyczne ze względu na stan chorych i ryzyko powikłań po biopsji, tym niemniej podkreśla się, że w niektórych przypadkach poziom eozynofilii we krwi może być prawidłowy, będą natomiast wykazane nacieki eozynofilowe w biopsji oskrzelowej. Więc to kryterium też może być podważane. Kolejny bardzo wątpliwy punkt nakazujący ostrożność to efekt „odwrócenia” stanu chorych po odstawieniu terapii. Wprawdzie autorzy doniesienia, w którym zwraca się uwagę na taki efekt, sami wyrażają wątpliwość, czy to jest efekt *rebound*, ale to wymaga dalszych badań i być może w najbliższym czasie wyniki takich badań, wyjaśniających patogenezę tego zjawiska, się pojawią. W tej chwili w dostępnych publikacjach nie ma jasnej odpowiedzi, skąd ten efekt się bierze.

Po ostatecznym sformułowaniu treści stanowiska Rady, prowadzący zarządził głosowanie. Rada 9 głosami za projektem stanowiska, przy 0 głosów przeciw projektowi, przyjęła uchwałę, będącą jej stanowiskiem, która stanowi załącznik do protokołu.

Dodany punkt porządku obrad, dotyczący korekty opinii wydanych podczas posiedzenia Rady w dniu 21 listopada br.

Anna Zawada, Dyrektora Biura Obsługi Rady Przejrzystości i Rady ds. Taryfikacji wyjaśniła, że konieczność dokonania korekt opinii wydanych przez Radę podczas posiedzenia w dniu 21 listopada br. wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli produktów leczniczych. Zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań, koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów leczniczych, dla których wydana została opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.

Następnie Tomasz Pasierski zarządził przeprowadzenie 13 głosowań, w wyniku których Rada, w każdym przypadku jednogłośnie, tj. 9 głosami za, przy 0 głosów przeciw, wniosła techniczne poprawki do następujących Opinii Rady Przejrzystości:

- 1) nr 332/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną azathioprinum,
- 2) nr 333/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną cyclophosphamidum,
- 3) nr 334/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną methotrexatum,
- 4) nr 335/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną amoxicillinum,
- 5) nr 336/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną amoxicillinum + acidum clavulanicum,
- 6) nr 337/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną chlorambucilum,
- 7) nr 338/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną diclofenacum,
- 8) nr 339/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną mycophenolas mofetil,
- 9) nr 340/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną sirolimusum,
- 10) nr 341/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną bisoprololum,
- 11) nr 342/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną spironolactonum,

12) nr 343/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną sulfamethoxazolium + trimethoprimum,


13) nr 344/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną tacrolimusum

- w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Opinie stanowią załączniki do protokołu.

**Ad 7.** Prowadzący posiedzenie Tomasz Pasierski zakończył posiedzenie Rady o godzinie 13.50.

Protokół sporządził Tomasz Pasierski  
Przewodniczący Rady Przejrzystości

  
..... 28-12-2016  
(data i podpis)





## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

### Stanowisko Rady Przejrzystości

nr 121/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie oceny leku Blincyto (blinatumomab) kod EAN: 5909991256371, w ramach programu lekowego „Leczenie blinatumomabem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B bez chromosomu Filadelfia w przypadku wznowy lub oporności na wcześniejszą terapię (ICD-10 C91.0)”

*Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Blincyto (blinatumomab), proszek do sporządzania koncentratu i roztwór do przygotowania roztworu do infuzji, 38,5 µg, 1 fiolka proszku do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji oraz 1 fiolka roztworu stabilizującego, kod EAN 5909991256371, w ramach programu lekowego „Leczenie blinatumomabem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B bez chromosomu Filadelfia w przypadku wznowy lub oporności na wcześniejszą terapię (ICD-10 C91.0)”, w ramach nowej grupy limitowej, jako leku wydawanego bezpłatnie, pod warunkiem takiego instrumentu dzielenia ryzyka, w którym refundowany będzie jedynie koszt terapii u pacjentów osiągających całkowitą remisję.*

*Rada widzi zasadność ograniczenia decyzji refundacyjnej do 1 roku i ponownej oceny technologii po tym okresie.*

#### **Uzasadnienie**

*Dowody naukowe o stosunkowo niskiej jakości (badania bez grupy kontrolnej opublikowane jako prace pełnotekstowe oraz badanie z grupą kontrolną opublikowane w formie streszczenia) wskazują na aktywność kliniczną blinatumomabu w populacji chorych, do której adresowany jest proponowany program lekowy. Miarą tego jest wysoki odsetek remisji choroby odnotowywany w badaniach dotyczących zastosowania tego leku wśród chorych ze wznową choroby lub opornością na wcześniejsze terapie. Zdaniem Rady szczególnie istotna jest udokumentowana możliwość uzyskania remisji w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie transplantacji szpiku kostnego (HSCT), co w badaniu Topp i wsp. 2015 odnotowano u 32/189, tj. 17% chorych. Zastosowanie blinatumomabu wiąże się z uzyskaniem 1-letniego przeżycia*



u około 30% chorych, tj. odsetka wyższego niż w historycznych grupach kontrolnych.

Jednocześnie Rada zwróciła uwagę na to, że wyniki kluczowego dla wiarygodnej oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania blinatumomabu badania randomizowanego Tower nie zostały dotychczas opublikowane w formie pełnotekstowej. W związku z tym, zdaniem Rady, zasadna jest ponowna ocena wnioskowanej technologii po 1 roku.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem blinatumomabu występują bardzo często i w wysokim odsetku przypadków są to działania w 3 lub 4 stopniu nasilenia. Do najczęstszych działań niepożądanych należy zaliczyć zakażenia, gorączkę neutropeniczną, niedokrwistość, neutropenię, małopłytkowość, leukopenię, zespół uwalniania cytokin, zaburzenia elektrolitowe, zmniejszenie łaknienia, bezsenność, ból głowy, drżenie, zawroty głowy, niedociśnienie, kaszel, zaburzenia żołądka i jelit, wysypkę, bóle pleców, kończyn, stawów i kości, obrzęki obwodowe, dreszcze, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, zwiększenie aktywności aminotransferaz oraz reakcje na infuzję i związane z nią objawy.

Cena blinatumomabu jest wysoka, a zaproponowany instrument dzielenia ryzyka nie zapewnia efektywności kosztowej stosowania leku w Polsce. Z tego powodu Rada nie akceptuje go i wnosi o przedstawienie nowego instrumentu dzielenia ryzyka, w którym refundowany będzie jedynie koszt terapii u pacjentów osiągających całkowitą remisję i który pozwoli na zmniejszenie kosztów inkrementalnych do progu opłacalności, o którym mowa w ustawie o refundacji.

We wnioskowanym programie lekowym nie określono kryteriów, na podstawie których należy stwierdzić progresję choroby wykluczającą udział pacjenta w programie, tym samym Rada zaleca ich sprecyzowanie.

Wśród rekomendacji refundacyjnych odnaleziono 3 pozytywne (walijska AWMMSG 2016, francuska HAS 2016, szkocka SMC 2016), 1 negatywną (australijską PBAC 2015) oraz 1, w której w zależności od stosowanych wcześniej linii leczenia wydano rekomendację negatywną lub warunkowo pozytywną (kanadyjska pCODR 2016). Blincyto (blinatumomab) jest obecnie finansowany w 9 krajach UE: są to wyłącznie kraje o PKB per capita wyższym niż Polska.

Zasadne byłoby wprowadzenie rejestru chorych leczonych Blincyto.

.....  
Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasiński



**Tryb wydania stanowiska**

Stanowisko wydano na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), z uwzględnieniem analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr OT.4351.32.2016 „Wniosek o objęcie refundacją leku Blincyto (blinatumomab) w ramach programu lekowego: „Leczenie blinatumomabem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek prekursorowych limfocytów B bez chromosomu Filadelfia w przypadku wznowy lub oporności na wcześniejszą terapię (ICD-10 C91.0)”.  
Data ukończenia: 17 listopada 2016, z uwzględnieniem stanowiska eksperta przedstawionego na posiedzeniu 28.11.2016 r.



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Stanowisko Rady Przejrzystości  
nr 122/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie oceny leku Lixiana (edoxabanum) kod EAN:  
5901549325058, we wskazaniu: leczenie zakrzepicy żył głębokich  
i zatorowości płucnej oraz zapobieganiu nawrotowej zakrzepicy  
żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych

*Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Lixiana (edoxabanum), tabl. powł., 30 mg, 30 szt., kod EAN 5901549325058, we wskazaniu: leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, w ramach istniejącej grupy limitowej 22.0 – Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych, jako leku dostępnego w aptece na receptę za odpłatnością w wysokości 30%.*

### Uzasadnienie

*Edoksaban (Lixiana) jest bezpośrednim inhibitorem czynnika X, podobnie jak rywaroksaban (Xarelto), i jest stosowany m.in. jako leczenie przeciwzakrzepowe w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. Podobnym lekiem jest bezpośredni inhibitor trombiny – dabigatran (Pradaxa). Dabigatran refundowany jest w Polsce w całym zakresie wnioskowanych wskazań; refundacja rywaroksabanu nie obejmuje leczenia zatorowości płucnej.*

*Nie odnaleziono randomizowanych badań klinicznych bezpośrednio porównujących edoksaban z rywaroksabanem. W związku z tym, do przeglądu włączono 1 randomizowane badanie kliniczne (Jadad 4) dotyczące porównania edoksabanu i antagonisty witaminy K – warfaryny (Hokusai-VTE) oraz 4 wielośrodkowe międzynarodowe randomizowane badania kliniczne, dotyczące porównania dabigatranu z warfaryną (RE-COVER i RE-COVER II) oraz rywaroksabanu z enoksaparyną/antagonistą witaminy K (EINSTEIN-DVT i EINSTEIN-PE). Analiza kliniczna, przeprowadzona na podstawie porównania pośredniego skuteczności edoksabanu i wybranych komparatorów względem antagonistów witaminy K, wykazała podobną skuteczność tych trzech interwencji we wnioskowanym wskazaniu. W żadnym z ocenianych punktów końcowych nie otrzymano istotnych statystycznie różnic w skuteczności*



*edoksabanu i rywaroksabanu oraz edoksabanu i dabigatranu. Zbliżony był też profil bezpieczeństwa edoksabanu względem rywaroksabanu i dabigatranu. Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą: krwawienia do tkanek miękkich w obrębie skóry, krwawienia z nosa oraz krwawienia z pochwy. Ponadto do częstych działań niepożądanych należą: niedokrwistość, wysypka, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.*

*Wnioskowane wskazanie edoksabanu to „Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych”. Zarejestrowane wskazanie wg ChPL to „Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych (niestabilni hemodynamicznie pacjenci z zatorowością płucną)”. Jednym z kryteriów włączenia w badaniu Hokusai-VTE była ostra objawowa zatorowość płucna, a w ramach pierwszorzędowego (złożonego) punktu końcowego analizowano częstość nawrotu objawowej żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej, obejmującej epizod zatorowości płucnej zakończonej lub niezakończonyj zgonem. Wydaje się, że różnica między wskazaniem wnioskowanym i zarejestrowanym w ChPL jest mało udokumentowana.*

*Analiza minimalizacji kosztów wykazała, iż lek Lixiana stanowi tańszą opcję terapeutyczną od dabigatranu i rywaroksabanu.*

*Odnaleziono 6 rekomendacji refundacyjnych 6 organizacji, odnoszących się do ocenianej interwencji we wskazaniu leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych. Wszystkie rekomendacje (w tym NICE) są pozytywne, zwraca się w nich jednak uwagę na brak środka specyficznego odwracającego działanie edoksabanu, co wiąże się z ryzykiem stosowania tego leku.*

.....  
Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski

**Tryb wydania stanowiska**

Stanowisko wydano na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), z uwzględnieniem analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr OT.4350.19.2016 „Wniosek o objęcie refundacją leku Lixiana (edoksaban) we wskazaniu: „Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych””. Data ukończenia: 18 listopada 2016 r.



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

### Stanowisko Rady Przejrzystości

nr 123/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie oceny leku Lixiana (edoxabanum) kod EAN:  
5901549325072, we wskazaniu: leczenie zakrzepicy żył głębokich  
i zatorowości płucnej oraz zapobieganiu nawrotowej zakrzepicy  
żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych

*Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Lixiana (edoxabanum), tabl. powł., 60 mg, 30 szt., kod EAN 5901549325072, we wskazaniu: leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganiu nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych, w ramach istniejącej grupy limitowej 22.0 - Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych, jako leku dostępnego w aptece na receptę za odpłatnością w wysokości 30%.*

#### Uzasadnienie

*Edoksaban (Lixiana) jest bezpośrednim inhibitorem czynnika X, podobnie jak rywaroksaban (Xarelto) i jest stosowany m.in. jako leczenie przeciwzakrzepowe w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. Podobnym lekiem jest bezpośredni inhibitor trombiny - dabigatran (Pradaxa). Dabigatran refundowany jest w Polsce w całym zakresie wnioskowanych wskazań; refundacja rywaroksabanu nie obejmuje leczenia zatorowości płucnej.*

*Nie odnaleziono randomizowanych badań klinicznych bezpośrednio porównujących edoksaban z rywaroksabanem. W związku z tym, do przeglądu włączono 1 randomizowane badanie kliniczne (Jadad 4) dotyczące porównania edoksabanu i antagonisty witaminy K – warfaryny (Hokusai VTE) oraz 4 wieloośrodkowe międzynarodowe randomizowane badania kliniczne, dotyczące porównania dabigatranu z warfaryną (RE-COVER i RE-COVER II) oraz rywaroksabanu z enoksaparyną/antagonistą witaminy K (EINSTEIN-DVT i EINSTEIN-PE). Analiza kliniczna, przeprowadzona na podstawie porównania pośredniego skuteczności edoksabanu i wybranych komparatorów względem antagonistów witaminy K, wykazała podobną skuteczność tych trzech interwencji we wnioskowanym wskazaniu. W żadnym z ocenianych punktów końcowych nie otrzymano istotnych statystycznie różnic w skuteczności*



*edoksabanu i rywaroksabanu oraz edoksabanu i dabigatranu. Zbliżony był też profil bezpieczeństwa edoksabanu względem rywaroksabanu i dabigatranu. Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą: krwawienia do tkanek miękkich w obrębie skóry, krwawienia z nosa oraz krwawienia z pochwy. Ponadto do częstych działań niepożądanych należą: niedokrwistość, wysypka, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.*

*Wnioskowane wskazanie edoksabanu to „Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych”. Zarejestrowane wskazanie wg ChPL to „Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych (niestabilni hemodynamicznie pacjenci z zatorowością płucną)”. Jednym z kryteriów włączenia w badaniu Hokusai-VTE była ostra objawowa zatorowość płucna, a w ramach pierwszorzędowego (złożonego) punktu końcowego analizowano częstość nawrotu objawowej żyłnej choroby zakrzepowo-zatorowej, obejmującej epizod zatorowości płucnej zakończonej lub niezakończonyj zgonem. Wydaje się, że różnica między wskazaniem wnioskowanym i zarejestrowanym w ChPL jest mało udokumentowana.*

*Analiza minimalizacji kosztów wykazała, iż lek Lixiana stanowi tańszą opcję terapeutyczną od dabigatranu i rywaroksabanu.*

*Odnaleziono 6 rekomendacji refundacyjnych 6 organizacji, odnoszących się do ocenianej interwencji we wskazaniu leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych. Wszystkie rekomendacje (w tym NICE) są pozytywne, zwraca się w nich jednak uwagę na brak środka specyficznego odwracającego działanie edoksabanu, co wiąże się z ryzykiem stosowania tego leku.*

.....  
Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski

**Tryb wydania stanowiska**

Stanowisko wydano na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), z uwzględnieniem analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr OT.4350.19.2016 „Wniosek o objęcie refundacją leku Lixiana (edoksaban) we wskazaniu: „Leczenie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej oraz zapobieganie nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych””. Data ukończenia: 18 listopada 2016 r.



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

### Stanowisko Rady Przejrzystości

nr 124/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie oceny leku Nucala (mepolizumab) kod EAN:  
5909991246617, w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej  
astmy eozynofilowej mepolizumabem (ICD-10 J82.0)”

*Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Nucala (mepolizumab) proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg, 1 fiolka, kod EAN: 5909991246617, w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy eozynofilowej mepolizumabem (ICD-10 J82.0)”, gdyż brak jest przekonujących danych klinicznych o długoterminowej efektywności i nie jest efektywna kosztowo.*

*W opinii Rady Przejrzystości modyfikacji wymaga również część zapisów programu lekowego w zakresie kryteriów włączenia i/lub wyłączenia chorych w oparciu o nie w pełni czuły i swoisty we wnioskowanym wskazaniu parametr, jakim jest liczba eozynofili we krwi, a także o wyniki badań spirometrycznych. Mało precyzyjne są również zapisy odnoszące się do wykluczenia zakażeń pasożytniczych u pacjentów kwalifikowanych do programu.*

#### Uzasadnienie

*Astma eozynofilowa charakteryzuje się podwyższonym poziomem eozynofili w materiale uzyskanym na drodze w biopsji oskrzelowej lub w płwocinie, pomimo przewlekłego stosowania odpowiednich dawek wziewnych kortykosteroidów. Liczba eozynofili w morfologii krwi nie jest wskaźnikiem wystarczająco czułym i swoistym w diagnostyce tego typu astmy. Znane są przypadki chorych z naciekami eozynofilowymi w oskrzelach przy prawidłowej liczbie krwinek kwasochłonnych we krwi obwodowej. Chorzy na astmę eozynofilową o wiele rzadziej są uczuleni na wziewne alergeny w porównaniu do innych fenotypów astmy. Mimo to u wielu pacjentów stwierdza się podwyższony poziom IgE. Może to być związane z nadwrażliwością na tzw. „ukryte alergeny” takie jak superantygeny wytwarzane przez bakterie *Staphylococcus aureus*. Inną charakterystyczną cechą fenotypu astmy eozynofilowej jest występowanie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa, które jest silnie skorelowane z podwyższonym poziomem eozynofili we krwi. Pacjentów z fenotypem astmy*



eozyofilowej cechuje niska jakość życia, zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich zaostrzeń lub konieczność przewlekłego doustnego stosowania kortykosteroidów.

Technologia będąca przedmiotem wniosku o refundację i ustalenie urzędowej ceny jej zbytu jest nieefektywna kosztowo, czego nie rekompensuje proponowany instrument dzielenia ryzyka przy proponowanej cenie zbytu. Rzutować to może również na nieuzasadniony z punktu widzenia korzyści zdrowotnych wzrost wydatków płatnika publicznego na leczenie we wnioskowanym wskazaniu.

Ze względu na nowatorski charakter wnioskowanej technologii nie jest ona dotychczas objęta refundacją w żadnym z państw UE, wymaga dalszych analiz profilu bezpieczeństwa, zwłaszcza pod kątem skutków klinicznych po przerwaniu stosowania wnioskowanego produktu leczniczego, a także analiz efektywności kosztowej w dłuższej perspektywie czasowej leczenia.

Obecnie poza leczeniem standardowym przewidzianym w rekomendacjach i wytycznych we wnioskowanym wskazaniu możliwe jest włączenie chorych do programu leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10 J 45.0) omalizumabem (program lekowy B.44). W praktyce klinicznej zwraca się uwagę na możliwość kwalifikowania poszczególnych pacjentów zarówno do grupy oznaczonej kodem ICD-10 J45, jak i ICD-10 J82. Wskaźniki częstości występowania astmy eozynofilowej w grupie chorych z ciężkimi objawami astmy odpornej na leczenie kortykosteroidami nie są dokładnie określone, ale na podstawie obserwacji klinicznych można ocenić, że jest to w tej grupie około 30% przypadków. Powoduje to trudności w precyzyjnym przewidywaniu populacji docelowej objętej leczeniem w ramach wnioskowanego programu lekowego, czego dodatkowym dowodem są różnice w oszacowaniu tej populacji w opiniach ekspertów, zwracających jednocześnie uwagę, że w Polsce nie ma zarejestrowanych badań dotyczących występowania eozynofilii u chorych na astmę.

Korzyścią wynikającą ze stosowania mepolizumabu (MEPO) może być u części chorych zmniejszenie dawek glikokortykosteroidów bądź innych leków stosowanych w leczeniu astmy. Obecnie chorzy są leczeni we wnioskowanym wskazaniu w oparciu przede wszystkim o wytyczne GINA 2016. Wskazuje się w nich na możliwość stosowania mepolizumabu w ramach 5 stopnia intensywności terapii u pacjentów w wieku powyżej 12 r. ż. W wytycznych tych nie zawarto szczegółowych zaleceń dotyczących stosowania wnioskowanej technologii. Z dostępnych źródeł wynika jednak, że stosowanie mepolizumabu powoduje znamienne statystycznie spadek częstości występowania klinicznie istotnych zaostrzeń astmy w stosunku do grupy kontrolnej, lecz porównywalnie w stosunku do omalizumabu (OMA). MEPO statystycznie znamienne zmniejsza

*natomiast ryzyko klinicznie istotnych zaostrzeń astmy w porównaniu pośrednim z OMA. Kontrola objawów astmy na podstawie oceny zmian punktacji wg kwestionariusza ACQ jest z kolei lepsza podczas stosowania OMA.*

*Podczas analizy doniesień naukowych dotyczących leczenia mepolizumabem zwraca uwagę ograniczona liczba danych długookresowych związanych z bezpieczeństwem dawki 100 mg podawanej we wstrzyknięciu podskórnym, a także ograniczona liczba danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku Nucala u osób starszych. W jednym z opublikowanych badań zaobserwowano, że zaprzestanie stosowania MEPO wiązało się ze wzrostem liczby eozynofili we krwi wkrótce po zakończeniu leczenia; w ciągu 6 miesięcy liczba eozynofili osiągała wartości sprzed badania. Częstość występowania ciężkich zaostrzeń również znacząco wzrosła w grupie uprzednio stosującej MEPO i po 12 miesiącach obserwacji była wyższa w grupie MEPO w porównaniu do placebo, jednak różnica ta nie była istotna statystycznie. Wzrost zaostrzeń w okresie od 3 do 6 miesiąca po zakończeniu badań z mepolizumabem została poprzedzona wzrostem eozynofili zarówno w płwocinie jak i we krwi, co może sugerować korelację pomiędzy zaostrzeniami a stężeniem eozynofili. Stwierdzono także zwiększenie nasilenia objawów astmy w grupie pacjentów wcześniej leczonych MEPO. Autorzy badania podkreślają wprawdzie, że jest mało prawdopodobne występowanie zjawiska „rebound” po stosowaniu mepolizumabu z powodu braku korelacji pomiędzy nasileniem objawów astmy, a innymi parametrami klinicznymi lub biologicznymi (liczba eozynofili), lecz wymaga to dalszych obserwacji.*

*Niezależnie od oceny możliwości wystąpienia działań niepożądanych mała liczba obserwacji długookresowych rzutuje również na możliwość miarodajnej kalkulacji kosztów leczenia z zastosowaniem MEPO w dłuższej perspektywie czasowej. Choć znaleziono w jednej rekomendacji refundacyjnej (CADTH 2016) zalecenie stosowania MEPO jako terapii dodanej do terapii standardowej, to nawet w tej rekomendacji wykazano, że nie jest to postępowanie efektywne kosztowo. Podobna konstatacja znajduje się w negatywnej rekomendacji NICE 2016, choć rekomendację tę należy traktować jako tymczasową wobec nie zakończonego jeszcze w jej ramach procesu konsultacji. Nucala nie jest refundowana z żadnym krajem UE i EFTA uwzględnionym we wniosku refundacyjnym.*

.....  
Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasiński

**Tryb wydania stanowiska**



Stanowisko wydano na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 2 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.), z uwzględnieniem analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr OT.4351.31.2016 „Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Nucala (mepolizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiej astmy eozynofilowej mepolizumabem (ICD-10 J 82.0)”. Data ukończenia: 18 listopada 2016 r.



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 464/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 332/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną azathioprinum, w zakresie wskazań  
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych  
niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 332/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną azathioprinum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117		



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041	
	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453	
	Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie		
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483			
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318			
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848			
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087			
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015			
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628			
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715			
	Azathioprinum		Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
			Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810				
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia		
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483			
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114			
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413			
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852			

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400	
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidozą; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113		
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidozą; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346	
	Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619	
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208		
Sirolimusum	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	
	Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414		
Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt.,	idiopatyczny zespół

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909990051052	nercycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....

Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezese Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości**  
nr 465/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 333/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną cyclophosphamidum, w zakresie  
wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania  
odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 333/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną cyclophosphamidum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117	





Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041	
	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453	
	Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie		
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483			
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318			
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848			
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087			
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015			
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628			
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715			
	Azathioprinum		Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
			Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810				
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia		
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483			
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114			
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413			
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852			

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400	
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidozą; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113		
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidozą; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346	
	Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619	
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208		
Sirolimusum	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	
	Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414		
Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt.,	idiopatyczny zespół

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909990051052	nercycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....

Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 466/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 334/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną methotrexatum, w zakresie wskazań  
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych  
niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 334/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną methotrexatum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117		



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041	
	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453	
	Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie		
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483			
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318			
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848			
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087			
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015			
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628			
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715			
	Azathioprinum		Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
			Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810				
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia		
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483			
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114			
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413			
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852			



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400	
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidozą; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113		
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidozą; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346	
	Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619	
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208		
Sirolimusum	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	
	Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414		
Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt.,	idiopatyczny zespół

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909990051052	nercycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....

Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezese Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 467/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 335/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną amoxicillinum, w zakresie wskazań  
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych  
niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 335/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną amoxicillinum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117		



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041	
	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453	
	Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie		
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483			
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318			
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848			
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087			
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015			
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628			
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715			
	Azathioprinum		Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
			Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810				
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia		
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483			
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114			
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413			
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852			

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400	
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidozą; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113		
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidozą; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346	
	Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619	
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208		
Sirolimusum	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	
	Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414		
Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt.,	idiopatyczny zespół



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909990051052	nercycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....

Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 468/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 336/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną amoxicillinum + acidum  
clavulanicum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania,  
lub sposobu podawania odmiennych niż określone  
w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 336/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną amoxicillinum + acidum clavulanicum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli dotyczącej zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej opinii, brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powł., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powł., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powł., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powł., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powł., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powł., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318	
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848	
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087	
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015	
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628	
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715	

oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej:

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117	
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041	
Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453		
Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477		
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318	
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848	
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087	
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015	
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628	
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.),	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909991087715	
Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
	Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810	
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483	
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114	
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448	
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400		
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidoza
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
	Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113	
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346	
Mycophenolas mofetil	Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
Sirolimusum	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208	
Rapamune	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	
	Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414	
Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990051052	idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedl. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedl. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedl. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedl. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	



*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....  
Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezese Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 469/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 337/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną chlorambucilum, w zakresie  
wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania  
odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 337/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną chlorambucilum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117	



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041	
	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453	
	Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie		
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483			
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318			
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848			
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087			
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015			
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628			
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715			
	Azathioprinum		Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
			Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810				
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia		
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483			
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114			
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413			
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852			

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400	
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidozą; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113		
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidozą; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346	
	Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619	
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208		
Sirolimusum	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	
	Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414		
Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt.,	idiopatyczny zespół

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909990051052	nercycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....

Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezese Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 470/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 338/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną diclofenacum, w zakresie wskazań  
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych  
niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 338/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną diclofenacum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli dotyczącej zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej opinii brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Ofen 75 SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Ofen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Ofen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
Ofen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150		





Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113	

oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej:

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granuląt do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117	
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041		
Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453		
Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477		
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny		

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318	
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848	
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087	
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015	
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628	
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715	
Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
	Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810	
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483	
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114	
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448		
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400		
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
	Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113	
	Methotrexatum	
Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726		
Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825		
Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303		
Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228		
Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266		
Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346		
Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619		
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208		
Sirolimusum		cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie
	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	
	Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414		
Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710		
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990051052	idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedl. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedl. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedl. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedl. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312		

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....  
Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezese Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 471/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 339/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną mycophenolas mofetil, w zakresie  
wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania  
odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 339/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną mycophenolas mofetil, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117	



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041	
	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453	
	Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie		
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483			
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318			
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848			
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087			
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015			
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628			
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715			
	Azathioprinum		Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
			Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810				
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia		
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483			
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114			
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413			
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852			

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400	
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidozą; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113		
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidozą; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346	
	Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619	
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208		
Sirolimusum	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spironolactonium	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	
	Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414		
Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt.,	idiopatyczny zespół

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909990051052	nercycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....

Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezese Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 472/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 340/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną sirolimusum, w zakresie wskazań  
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych  
niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 340/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną sirolimusum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117		



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041	
	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453	
	Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie		
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483			
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288			
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318			
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800			
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848			
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087			
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015			
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073			
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594			
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611			
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628			
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715			
	Azathioprinum		Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
			Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810				
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia		
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070			
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551			
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483			
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114			
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529			
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420			
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413			
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852			

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448	
	Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400	
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidozą; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113		
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidozą; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346	
	Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619	
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208		
Sirolimusum	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	
	Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414		
Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt.,	idiopatyczny zespół

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909990051052	nercycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....

Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 473/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 341/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną bisoprololum, w zakresie wskazań  
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych  
niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 341/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną bisoprololum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli dotyczącej zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej opinii brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe – u pacjentów powyżej 6 roku życia
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483	
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114	
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448		
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400		

*oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej:*



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granuląt do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117	
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041		
Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453		
Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477		
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318	
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848	
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087	
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015	
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.),	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909990430628	
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715	
Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
	Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810	
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483	
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114	
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554		
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448		
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400		
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	blisť. po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp. po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blisť. po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 blisť. po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blisť. po 10 szt.), 5909990457137	
	Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blisť. po 10 szt.), 5909990457113	
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj. po 100 szt.), 5909990730346	
	Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619	
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powł., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blisť. po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powł., 500 mg, 50 szt. (5 blisť. po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powł., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powł., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
	Myfenax, tabl. powł., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208	
Sirolimusum	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	
	Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414	
Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990051052	idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888		



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....

Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezese Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 474/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 342/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną spironolactonum, w zakresie  
wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania  
odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 342/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną spironolactonum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli dotyczącej zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej opinii brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668
	Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215
	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414

*oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117	
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041	
	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453	
	Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.),	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318	
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848	
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087	
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015	
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628	
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715	
Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
	Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483	
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114	
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448		
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400		
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidozą; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
	Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113	
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346	
Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619		
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208		
Sirolimusum	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Spironol 100, tabl. powł., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414	
Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990051052	idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów*

*lecznicych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....  
Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski





## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezese Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 475/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 343/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną sulfamethoxazolum +  
trimethoprimum, w zakresie wskazań do stosowania lub  
dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone  
w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 343/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną sulfamethoxazolum + trimethoprimum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli dotyczącej zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej opinii brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710		

*oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej.*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granulaty do sporządzenia zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	



Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117	
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
	Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041	
	Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453	
	Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477	
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.),	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318	
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848	
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087	
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015	
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990430611	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628	
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715	
Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
	Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483	
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114	
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448		
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400		
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidozą; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	blist.po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), 5909990457137	
	Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990457113	
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj.po 100 szt), 5909990730346	
Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619		
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powl., 500 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
Myfenax, tabl. powl., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208		
Sirolimusum	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spironolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Spironol 100, tabl. powł., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414	
Sulfamethoxazolium + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990051052	idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów*

*lecznicych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....  
Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski



## Rada Przejrzystości

działająca przy

Prezese Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

**Uchwała Rady Przejrzystości  
nr 476/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku  
w sprawie korekty opinii Rady Przejrzystości nr 344/2016  
z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków  
zawierających substancję czynną tacrolimusum, w zakresie wskazań  
do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych  
niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego**

*Niniejszą uchwałą Rada Przejrzystości zmienia treść opinii Rady Przejrzystości nr 344/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną tacrolimusum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nadając tabeli dotyczącej zasadności objęcia refundacją leków, zawartej części głównej opinii brzmienie jak poniżej:*

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990051052	idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek – w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	
Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888		
Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949		





oraz nadając tabeli zawartej części „Przedmiot zlecenia” brzmienie jak poniżej:

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
Amoxicillinum	Amotaks, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691319	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amotaks, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089153	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909990691517	
	Amotaks, kaps. twarde, 500 mg, 20 szt., 5909991089108	
	Amotaks, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 60 ml (39,2 g), 5909990794379	
	Amotaks DIS, tabl., 1 g, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043728	
	Amotaks Dis, tabl., 1 g, 20 szt., 5909991089146	
	Amotaks DIS, tabl., 500 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043520	
	Amotaks Dis, tabl., 500 mg, 20 szt., 5909991089122	
	Amotaks DIS, tabl., 750 mg, 16 szt. (2 blist.po 8 szt.), 5909991043629	
	Amotaks Dis, tabl., 750 mg, 20 szt., 5909991089139	
	Duomox, tabl., 1000 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063413	
	Duomox, tabl., 250 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063215	
	Duomox, tabl., 375 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328314	
	Duomox, tabl., 500 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990063314	
	Duomox, tabl., 750 mg, 20 szt. (4 blist.po 5 szt.), 5909990328413	
	Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg, 16 szt., 5909990066018	
	Hiconcil, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990083619	
	Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg, 16 szt., 5909990066117	
	Ospamox, tabl. powl., 1000 mg, 16 szt., 5909990293322	
	Ospamox, tabl. powl., 500 mg, 16 szt., 5909990293124	
	Ospamox, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990781874	
	Ospamox, tabl. powl., 750 mg, 16 szt., 5909990293223	
Ospamox 1000 mg, tabl., 1000 mg, 20 szt., 5909990778041		
Ospamox 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 20 szt., 5909990788453		
Ospamox 750 mg, tabl. powl., 750 mg, 20 szt., 5909990788477		
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (8,75 g), 5909990894819	zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (17,5 g), 5909990894826	
	Amoksiklav, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (35 g), 5909990894833	
	Amoksiklav, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990081912	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990411115	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 20 szt., 5909991012960	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991243319	
	Amoksiklav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991250324	
	Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 875+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990649747	
	Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporządzania zawiesiny	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	doustnej/tab. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500+125 mg, 14 szt. (7 blist.po 2 szt.), 5909990646906	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 35 ml (but.), 5909991050443	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 70 ml (but.), 5909991050467	
	Auglavin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 140 ml (but.), 5909991050665	
	Auglavin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990815623	
	Auglavin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990815883	
	Augmentin, tabl. powl., 250+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.), 5909990064120	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 5,3 g proszku do sporządzenia 35 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419319	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 10,6 g proszku do sporządzenia 70 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419326	
	Augmentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5 ml, 21 g proszku do sporządzenia 140 ml zawiesiny w 1 but., 5909990419333	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990368235	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997199702	
	Augmentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909997219684	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990717521	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997198385	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997217345	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230740	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991209483	
	Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909997230542	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 50 ml, 5909990614288	
	Augmentin ES, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5 ml, 100 ml, 5909990614318	
	Augmentin SR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000+62,5 mg, 28 szt. (7 blist.po 4 szt.), 5909990041985	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt., 5909990744800	
	Co-amoxiclav Bluefish, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909990744848	
	Forcid 1000, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990219087	
	Forcid 312, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg, 20 szt. (5 blist.po 4 szt.), 5909990968015	
	Forcid 625, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990968114	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt., 5909991042073	
	Ramoclav, tabl. powl., 875+125 mg, 21 szt., 5909991042080	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 140 ml (25,2 g), 5909990793587	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 35 ml (6,3 g), 5909990793594	
	Taromentin, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 400 + 57 mg/5 ml, 70 ml (12,6 g), 5909990793600	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 21 szt. (3 blist.po 7 szt.),	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	5909990430611	
	Taromentin, tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909990430628	
	Taromentin, tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt. (2 blist.po 7 szt.), 5909991087715	
Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 50 szt. (1 słoik po 50 szt.), 5909990232819	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Azathioprine VIS, tabl., 50 mg, 30 szt. (1 słoik po 30 szt.), 5909990232826	
	Imuran, tabl. powl., 50 mg, 100 szt. (4 blist.po 25 szt.), 5909990277810	
Bisoprololum	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991197049	tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6 roku życia
	Bicardef 10 mg, tabl. powl., 10 mg, 90 tabl., 5909991197056	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991197070	
	Bicardef 5 mg, tabl. powl., 5 mg, 90 tabl., 5909991197063	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 10 mg, 30 tabl., 5909990813551	
	Bisoprolol Actavis, tabl., 5 mg, 30 tabl., 5909990813483	
	Bisoratio 10, tabl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015114	
	Bisoratio 5, tabl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991015015	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909991066529	
	Corectin 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066512	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909991066420	
	Corectin 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991066413	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633852	
	Coronal 10, tabl. powl., 10 mg, 60 tabl., 5909990633869	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990633791	
	Coronal 5, tabl. powl., 5 mg, 60 tabl., 5909990633807	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., 5909991097523	
	Sobycor, tabl. powl., 10 mg, 60 szt., 5909991097554	
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 60 szt., 5909991097448		
Sobycor, tabl. powl., 5 mg, 30 szt., 5909991097400		
Chlorambucilum	Leukeran, tabl. powl., 2 mg, 25 szt., 5909990345618	amyloidozą
Cyclophosphamidum	Endoxan, tabl. drażowane, 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.), 5909990240814	sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenie płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Diclofenacum	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 5 amp.po 3 ml, 5909990753017	ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Diclac, roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, 75 mg/3 ml, 10 amp.po 3 ml, 5909990753024	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957811	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990957828	
	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 20 szt., 5909997199627	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.), 5909990957712	
	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 10 szt. (1	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	blisť. po 10 szt.), 5909990957729	
	DicloDuo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blisť. po 10 szt.), 5909990752010	
	Majamil prolongatum, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt., 5909990033614	
	Naklofen, roztwór do wstrzykiwań, 25 mg/ml, 5 amp. po 3 ml, 5909990241910	
	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg, 20 szt., 5909990487714	
	Olfen 75 SR, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg, 30 szt. (3 blisť. po 10 szt.), 5909990974122	
	Olfen Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 30 szt. (3 blisť. po 10 szt.), 5909990457120	
	Olfen UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 60 szt. (6 blisť. po 10 szt.), 5909990457137	
	Olfen Uno, Dicloratio Uno, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg, 10 szt. (1 blisť. po 10 szt.), 5909990457113	
Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg, 50 szt., 5909990453924	sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg, 50 szt., 5909990453726	
	Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg, 50 szt., 5909990453825	
	Metotab, tabl., 10 mg, 100 tabl., 5909991064303	
	Metotab, tabl., 2,5 mg, 100 tabl., 5909991064228	
	Metotab, tabl., 7,5 mg, 100 tabl., 5909991064266	
	Trexan, tabl., 10 mg, 100 szt. (1 poj. po 100 szt), 5909990730346	
	Trexan, tabl., 2,5 mg, 100 szt. (but.), 5909990111619	
Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 1 g/5 ml, 110 g (175 ml), 5909990980918	choroby autoimmunizacyjne u pacjentów z niedoborami odporności; cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego
	CellCept, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990707614	
	CellCept, tabl., 500 mg, 50 szt., 5909990707515	
	Mycophenolate Mofetil Accord, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt., 5909990754472	
	Mycophenolate Mofetil Accord, tabl. powł., 500 mg, 50 szt., 5909990750993	
	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps. twarde, 250 mg, 100 szt. (10 blisť. po 10 szt.), 5909990718375	
	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powł., 500 mg, 50 szt. (5 blisť. po 10 szt.), 5909990718405	
	Mycophenolate mofetil Sandoz 500 mg tabletki powlekane, tabl. powł., 500 mg, 50 szt., 5909990715268	
	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg, 100 szt., 5909990807703	
	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powł., 500 mg, 50 szt., 5909990807741	
	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg, 100 kaps., 5909990638185	
Myfenax, tabl. powł., 500 mg, 50 tabl., 5909990638208		
Sirolimusum	Rapamune, tabl. draż., 1 mg, 30 szt., 5909990985210	cytopenie w przebiegu autoimmunizacyjnego zespołu limfoproliferacyjnego - odporne na stosowanie steroidów lub przy zbyt nasilonych objawach niepożądanych przewlekłej steroidoterapii w wysokich dawkach;
	Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml, 60 ml (but.+30 strzyk.), 5909990893645	
Spirolactonum	Finospir, tabl., 100 mg, 30 szt., 5909990965977	pozawałowa dysfunkcja

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Finospir, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990965861	skurczowa lewej komory
	Finospir, tabl., 25 mg, 30 szt., 5909990965854	
	Finospir, tabl., 50 mg, 30 szt., 5909990965878	
	Finospir, tabl., 50 mg, 100 szt., 5909990965885	
	Spironol, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990110216	
	Spironol, tabl., 25 mg, 100 szt., 5909990110223	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 30 szt., 5909991244651	
	Spironol, tabl. powl., 50 mg, 60 szt., 5909991244668	
	Spironol 100, tabl. powl., 100 mg, 20 szt., 5909990673124	
	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg, 30 szt., 5909990488513	
	Verospiron, tabl., 25 mg, 20 szt., 5909990117215	
	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg, 30 szt., 5909990488414	
Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990312610	zakażenia u pacjentów leczonych cyklofosfamidem - profilaktyka
	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 mg/5 ml, 1 but.po 100 ml, 5909990117819	
	Biseptol 120, tabl., 100+20 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117529	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt. (1 blist.po 20 szt.), 5909990117611	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 tabl., 5909997231563	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991192341	
	Biseptol 480, tabl., 400+80 mg, 20 szt., 5909991232092	
	Biseptol 960, tabl., 800+160 mg, 10 szt. (1 blist.po 10 szt.), 5909990117710	
Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990051052	idiopatyczny zespół nerczycowy - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę; toczniowe zapalenie nerek - w przypadku nietolerancji cyklosporyny lub oporności na cyklosporynę
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990051076	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg, 30 szt., 5909990699957	
	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990051137	
	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990783489	
	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990783571	
	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990783533	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 0,75 mg, 30 szt., 5909991192709	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 30 szt., 5909991192730	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1 mg, 90 szt., 5909991192754	
	Envarsus, tabl. o przedł. uwalnianiu, 4 mg, 30 szt., 5909991192761	
	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909991148713	
	Prograf, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447213	
	Prograf, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), 5909990447312	
	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990821006	
	Tacni, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990821228	
	Tacni, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990821280	
	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg, 30 szt., 5909990836857	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku, Zawartość opakowania, kod EAN	Wskazanie
	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg, 30 szt., 5909990836888	
	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg, 30 szt., 5909990836949	

*Zmiana wynika z błędu technicznego, polegającego na umieszczeniu w szablonie opinii niewłaściwej tabeli. Powyższa zmiana nie wpływa na merytoryczną treść opinii, która nadal dotyczy tej samej substancji czynnej i wskazań – niniejsza uchwała koryguje jedynie zakres przedmiotowy produktów leczniczych, dla których przygotowywana była opinia, na zgodny ze zleceniem Ministra Zdrowia.*

.....

Przewodniczący Rady Przejrzystości  
prof. Tomasz Pasierski