

**Dabigatran (Pradaxa®)
w prewencji udarów i zatorowości
systemowej u dorosłych pacjentów
z niezastawkowym migotaniem
przedsionków, u których ryzyko udaru
mózgu wynosi 3 lub więcej punktów
w skali CHADS₂**

Analiza racjonalizacyjna



Warszawa
kwiecień 2014

Autorzy raportu:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Adres do korespondencji:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Konflikt interesów:

Opracowanie wykonane na zlecenie i finansowane przez Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Zleceniodawca raportu/finansowanie projektu:

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
tel. +48 (22) 699 06 99

Przedstawiciel zleceniodawcy odpowiedzialny za kontakt w sprawie raportu:

[REDACTED]
[REDACTED]

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
tel. +48 (22) 699 06 99

Cytowanie:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Spis treści

Spis treści	4
1 Wstęp	5
2 Cel analizy	8
3 Wyniki analizy wpływu na budżet.....	9
4 Proponowane rozwiązanie	11
5 Metody.....	13
6 Wyniki analizy racjonalizacyjnej	14
7 Podsumowanie	16
Spis tabel.....	17
Spis ilustracji.....	18
Piśmiennictwo	19

1 Wstęp

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122 poz. 696) analiza racjonalizacyjna powinna być przedkładana w przypadku, gdy analiza wpływu na budżet podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych wykazuje wzrost kosztów refundacji.¹ Analiza ta powinna przedstawiać rozwiązania dotyczące refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, których objęcie refundacją spowoduje uwolnienie środków publicznych w wielkości odpowiadającej co najmniej wzrostowi kosztów wynikającemu z analizy wpływu na budżet.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

2 Cel analízy

[Redacted text block]

3 Wyniki analizy wpływu na budżet

[Redacted content]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

4 Proponowane rozwiązanie

[Redacted text block containing the proposed solution]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

5 Metody

[Redacted text block containing the methodology section]

Dabigatran (Pradaxa®) w profilaktyce zakrzepowo-zatorowej u chorych z migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru mózgu wynosi ≥ 3 punkty w skali CHADS₂ – analiza racjonalizacyjna.

[Redacted]				
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

7 Podsumowanie

[Redacted text block]

Spis tabel



Spis ilustracji



Piśmiennictwo

[Redacted bibliography content]