

## ERRATA

do raportu nr: **WT.422.2.2020**

Opracowanie dotyczące oceny zasadności finansowania leku MabThera (rytuksymab) we wskazaniu: przewlekła ciężka choroba przeszczep przeciw gospodarzowi (ICD10:T86.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych – zlecenie nr 195/2020 w BIP Agencji.

Zmiany zaznaczono **wyboldowaniem**:

Rozdział, strona, akapit, nr wiersza,	Jest	Powinno być
Rozdział 1., str. 6, akp. 7, wiersz 6	Zmianę sposobu leczenia immunosupresyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dawki sterydów, oceniano w 5 badaniach. Największa liczba (n=3) badań dotyczy wyników w okresie 1 roku obserwacji: częstość związana z brakiem zmiany w dawkowaniu sterydów mieści się w przedziale 0%–50%, częstość związana z częściową redukcją dawki mieści się w przedziale <b>24%–50%</b> , częstość związana z całkowitym wstrzymaniem podawania sterydów mieści się w przedziale 17%–29%.	Zmianę sposobu leczenia immunosupresyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dawki sterydów, oceniano w 5 badaniach. Największa liczba (n=3) badań dotyczy wyników w okresie 1 roku obserwacji: częstość związana z brakiem zmiany w dawkowaniu sterydów mieści się w przedziale 0%–50%, częstość związana z częściową redukcją dawki mieści się w przedziale <b>28%–72%</b> , częstość związana z całkowitym wstrzymaniem podawania sterydów mieści się w przedziale 17%–29%.
Rozdział 3.13, str. 19, tabela nr 8, kolumna 4, wiersz 6, badanie Kim 2010	Redukcja dawki/częściowa odpowiedź – n/N (%)  15/21 ( <b>24%</b> )	Redukcja dawki/częściowa odpowiedź – n/N (%)  15/21 ( <b>72%</b> )