



Dupilumab (Dupixent[®]) w leczeniu atopowego zapalenia skóry u młodzieży w wieku 12 - 17 lat

Uzupełnienie analiz HTA względem minimalnych wymagań

Warszawa, 2021

Autorzy

██████████
██████████

Dane kontaktowe

HealthQuest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa
tel/fax +48 22 468 05 34
kontakt@healthquest.pl
<http://www.healthquest.pl>

Konflikt interesów

Opracowanie wykonane na zlecenie i finansowane przez Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Zamawiający

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Spis treści

1	W ramach uwag do całości analizy	3
2	W ramach aktualności przedstawionej dokumentacji.....	10
3	W ramach analizy klinicznej (AKL)	11
4	W ramach analizy ekonomicznej (AE).....	12
5	W ramach analizy wpływu na budżet (BIA).....	19
6	Wskazanie źródeł danych.....	20
7	Inne	21
8	Aneksy.....	22
8.1	Aneks 1.....	22
8.2	Aneks 2	25
	Spis tabel	34

1 W ramach uwag do całości analizy

[Redacted text block containing multiple paragraphs of blacked-out content]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]			
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

2 W ramach aktualności przedstawionej dokumentacji

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

[Redacted text line]

[Redacted header 1]	[Redacted header 2]
[Redacted table cell 1]	[Redacted table cell 2]

[Redacted text line]

3 W ramach analizy klinicznej (AKL)

[Redacted text block containing multiple paragraphs of blacked-out content]

4 W ramach analizy ekonomicznej (AE)

[Redacted text block containing multiple paragraphs of blacked-out content]

[Redacted text block containing multiple paragraphs of blacked-out content]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

5 W ramach analizy wpływu na budżet (BIA)

[Redacted text block]

6 Wskazanie źródeł danych

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

7 Inne

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

8 Aneksy

8.1 Aneks 1

Leki przeciwhistaminowe

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące dichlorowodorku cetyryzyny. Dane dotyczące technologii stosowanej w ramach BSC opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) produktu Zyrtec 10 mg (preparatu o największym udziale w rynku w 2020 roku wg DGL) dostępnej na stronie <https://rejstrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public>

Tab. 18. Charakterystyka technologii alternatywnej we wnioskowanym wskazaniu.

Nazwa handlowa, postać i dawka - opakowanie - kod EAN	Zyrtec, 10 mg, tabletki powlekane 05909990184637, Rp.
Kod ATC i nazwa grupy	Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego, pochodne piperazyny, kod ATC: R06A E07
Substancja czynna	Dichlorowodorku cetyryzyny
Wskazanie	Atopowe zapalenie skóry
Dawkowanie	Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg raz na dobę (1 tabletki).
Droga podania	Do ustnie.
Mechanizm działania na podstawie ChPL	Cetyryzyna, metabolit hydroksyzyny u człowieka, jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Badania wiązania z receptorem in vitro nie wykazały istotnego powinowactwa do innych receptorów niż H1.

Status rejestracyjny

W tabeli poniżej przedstawiono status rejestracyjny cetyryzyny.

Tab. 19. Status rejestracyjny cetyryzyny.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu	Data wydania pierwszego pozwolenia: 15 lutego 1989 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30 marca 2012.
Zarejestrowane wskazania do stosowania	Zyrtec, 10 mg, tabletki powlekane jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: - w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. - w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.
Status leku sierocego	Nie
Warunki dopuszczenia do obrotu	-

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Opadry Y-1-7000), hydroksyzynę lub pochodne piperazyny.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min.

Przedawkowanie

Objawy obserwowane po przedawkowaniu cetyryzyny są związane głównie z działaniem na ośrodkowy układ nerwowy lub mogą wskazywać na działanie przeciwcholinergiczne. Po przyjęciu dawki cetyryzyny co najmniej 5 razy większej od zalecanej dawki dobowej zgłaszano następujące działania niepożądane: splątanie, biegunkę, zawroty głowy, zmęczenie, ból głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, sedację, senność, osłupienie, tachykardię, drżenie i zatrzymanie moczu.⁷

Postępowanie po przedawkowaniu: Nie jest znane swoiste antidotum dla cetyryzyny. W razie przedawkowania zaleca się leczenie objawowe lub podtrzymujące. Jeżeli od zażycia dawki leku upłynęło niewiele czasu, można rozważyć wykonanie płukania żołądka. Cetyryzyna nie jest skutecznie usuwana metodą hemodializy.

Działania niepożądane

W badaniach klinicznych wykazano, że cetyryzyna w zalecanych dawkach wywołuje działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego o nieznacznym nasileniu, w tym senność, zmęczenie, bóle i zawroty głowy. W niektórych przypadkach obserwowano paradoksalne pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Mimo iż cetyryzyna jest selektywnym antagonistą obwodowych receptorów H₁ i jest praktycznie pozbawiona aktywności cholinolitycznej, zgłaszano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji oka i suchości błony śluzowej jamy ustnej.

Zgłaszano przypadki zaburzeń czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i ze zwiększonym stężeniem bilirubiny. W większości przypadków ustępowały one po przerwaniu przyjmowania cetyryzyny dichlorowodoru.

Działania niepożądane występujące z częstością 1% lub większą u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat, stwierdzone w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, to:

Tab. 20. Działania niepożądane.

Działania niepożądane występujące z częstością 1% lub większą u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat, stwierdzone w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, to:	Cetyryzyna (n = 1 656)	Placebo (n = 1 294)
Zaburzenia żołądka i jelit: biegunka	1,0%	0,6%
Zaburzenia psychiczne: senność	1,8%	1,4%
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zapalenie błony śluzowej nosa	1,4%	1,1%
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zmęczenie	1,0%	0,3%

Częstość występowania określono następująco: bardzo często ($\geq 1/10$), często ($\geq 1/100$ do $< 1/10$), niezbyt często ($\geq 1/1\ 000$ do $< 1/100$), rzadko ($\geq 1/10\ 000$ do $< 1/1\ 000$), bardzo rzadko ($< 1/10\ 000$), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana: zwiększenie apetytu

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: pobudzenie

Rzadko: zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność

Bardzo rzadko: tiki

Częstość nieznana: myśli samobójcze, koszmary senne

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: parestezja

Rzadko: drgawki

Bardzo rzadko: zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza

Częstość nieznana: amnezja, osłabienie pamięci

Zaburzenia oka

Bardzo rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana: zawroty głowy

Zaburzenia serca

Rzadko: tachykardia

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, GGTP i zwiększone stężenie bilirubiny)

- Częstość nieznana: zapalenie wątroby
- Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
 - Niezbyt często: świąd, wysypka
 - Rzadko: pokrzywka
 - Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa
 - Częstość nieznana: ostra uogólniona osutka krostkowa
- Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej
 - Częstość nieznana: bóle stawów
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych
 - Bardzo rzadko: bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu
 - Częstość nieznana: zatrzymanie moczu
- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
 - Niezbyt często: osłabienie, złe samopoczucie
 - Rzadko: obrzęki
- Badania diagnostyczne
 - Rzadko: zwiększenie masy ciała

8.2 Aneks 2

Refundowane leki przeciwhistaminowe stosowane w ramach BSC na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r.

Tab. 21. Substancje refundowane we wskazaniu atopowego zapalenia skóry (Obwieszczenie MZ z dnia 21 kwietnia 2021 r.).

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena hurtowa brutto	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania ^a	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
Katalog A1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym										
Leki przeciwhistaminowe										
Cetirizini dihydrochlor idum	Allertec, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	05909990569441	207.1, Lek przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,79	11,33	14,86	12,93	5,81	10,79
	Allertec, syrop, 5 mg/5 ml	1 but. po 100 ml	05909990851119	207.1, Lek przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,98	10,48	13,00	8,85	6,81	9,98
	Cetirizine Genoptim, tabl. powł., 10 mg	30 szt.	05909990969739	207.2, Lek przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,64	9,07	12,60	12,60	3,78	8,64
Cetirizinum	Zyrtec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	1 but. 20 ml	05909991386672	207.2, Lek przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	11,77	12,36	16,56	16,56	4,97	11,77
	Alermed, tabl. powł., 10 mg	30 szt.	05909990910793	207.1, Lek przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	11,34	14,87	12,93	5,82	10,80

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena hurtowa brutto	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania ^a	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
	Alletec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	10 ml w but. z kroplonierzem	05909991103811	207.1, Lekki przeciwhistaminowo doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,79	7,13	9,65	8,85	3,46	6,79
	Alletec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	20 ml w but. z kroplonierzem	05909991103835	207.1, Lekki przeciwhistaminowo doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	12,59	16,79	16,79	5,04	11,99
	Amertil, tabl. powł., 10 mg	20 szt.	05909990410729	207.1, Lekki przeciwhistaminowo doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,48	6,80	9,33	8,62	3,30	6,48
	Amertil, tabl. powł., 10 mg	30 szt.	05909990410736	207.1, Lekki przeciwhistaminowo doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,15	10,66	14,19	12,93	5,14	10,15
	Amertil, tabletki powlekane, 10 mg	60 tabl.	05907695215250	207.1, Lekki przeciwhistaminowo doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,41	20,38	25,93	25,85	7,84	19,41
	Letizen, tabl. powł., 10 mg	20 szt.	05909990869725	207.2, Lekki przeciwhistaminowo doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	7,13	7,49	10,03	8,62	4,00	7,13

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena hurtowa brutto	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeń iobiorcy
Levocetirizini dihydrochloridum	Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml	75 ml	05909990781515	207.2, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,74	9,18	11,20	6,63	6,56	8,74
	Zyrtec, tabl. powł., 10 mg	30 szt. (3 blist. po 10 szt.)	05909990184637	207.2, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	14,47	15,19	18,71	12,93	9,66	14,47
	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	20 ml	05909990184736	207.2, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,85	13,49	17,69	17,69	5,31	12,85
	Cezera, tabl. powł., 5 mg	20 szt. (2 blist. po 10 szt.)	05909990656929	207.1, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	11,34	13,87	8,62	7,84	10,80
	Cezera, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	05909990656936	207.1, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	15,34	16,11	19,45	12,06	11,01	15,34
	Cezera, tabl. powł., 5 mg	30 szt. (3 blist. po 10 szt.)	05909990656943	207.1, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,20	17,01	20,54	12,93	11,49	16,20
Cezera, tabl. powł., 5 mg	90 tabl.	05909991192600	207.1, Lekki przeciwhistaminowo	37,80	39,69	46,76	38,78	19,61	37,80	

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena hurtowa brutto	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
				we do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne						
	Contrahist, roztwór doustny, 0.5 mg/ml	1 but.po 200 ml	05909990904099	207.1, Lekki przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,93	18,83	23,04	17,69	10,66	17,93
	Contrahist, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	05909990904129	207.1, Lekki przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	14,90	15,65	18,99	12,06	10,55	14,90
	Contrahist, tabl. powł., 5 mg	56 szt.	05906414000726	207.1, Lekki przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	20,06	21,06	26,35	24,13	9,46	20,06
	Contrahist, tabl. powł., 5 mg	84 szt.	05906414000733	207.1, Lekki przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	30,08	31,58	38,34	36,19	13,01	30,08
	Leceetax, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	05909990997640	207.1, Lekki przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	11,75	12,34	15,68	12,06	7,24	11,75
	Lirra, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	05909990790807	207.1, Lekki przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,77	10,26	13,60	12,06	5,16	9,77

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena hurtowa brutto	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
				postacie farmaceutyczne						
	Litra, tabl. powł., 5 mg	56 szt.	05902020241133	207.1, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	19,63	20,61	25,90	24,13	9,01	19,63
	Litra, tabl. powł., 5 mg	84 szt.	05902020241140	207.1, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	29,45	30,92	37,68	36,19	12,35	29,45
	Nossin, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	05909991060589	207.1, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,82	10,31	13,65	12,06	5,21	9,82
	Xyzal, tabl. powł., 5 mg	28 szt. (4 blist. po 7 szt.)	05909990918072	207.1, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	22,11	23,22	26,56	12,06	18,12	22,11
	Xyzal, tabl. powł., 5 mg	7 szt. (1 blist. po 7 szt.)	05909990918041	207.1, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,78	7,12	8,07	3,02	5,96	6,78
	Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0.5 mg/ml	1 but. po 200 ml	05909991358105	207.1, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,63	17,46	21,66	17,69	9,28	16,63

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena hurtowa brutto	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
	Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0.5 mg/ml	1 but. po 200 ml	05909991376550	207.1, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,85	17,69	21,89	17,69	9,51	16,85
	Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny, roztwór doustny, 0.5 mg/ml	1 szt. (1 but. po 200 ml)	05909990619627	207.1, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,29	22,35	26,55	17,69	14,17	21,29
	Zenaro, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	05909990781720	207.2, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	14,04	14,74	18,08	12,06	9,64	14,04
	Zyx, tabl. powł., 5 mg	28 szt.	05909990765034	207.2, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	15,61	16,39	19,73	12,06	11,29	15,61
	Zyx, tabl. powł., 5 mg	56 szt.	05907695215014	207.2, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	27,54	28,92	34,21	24,13	17,32	27,54
	Zyx, tabletki powlekane, 5 mg	84 tabletki	05907695215267	207.2, Lekki przeciwhistaminowo we do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	30,06	31,56	38,32	36,19	12,99	30,06
	Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml	120 ml	05909990739318	207.2, Lekki przeciwhistaminowo	9,29	9,75	12,68	10,61	5,25	9,29

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena hurtowa brutto	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
Loratadinum	Flonidan, tabl., 10 mg	30 szt. (3 blist. po 10 szt.)	05909990739233	we do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,53	13,16	16,70	12,93	7,65	12,53
				207.1, Lekki przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,92	25,12	30,67	25,85	12,58	23,92
	Flonidan, tabl., 10 mg	60 szt. (6 blist. po 10 szt.)	05909990223343	207.1, Lekki przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	38,66	40,59	47,66	38,78	20,51	38,66
				207.1, Lekki przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,10	12,71	16,24	12,93	7,19	12,10
	Loratadyna Galena, tabl., 10 mg	30 szt. (3 blist. po 10 szt.)	05909990795420	207.1, Lekki przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	23,91	25,11	30,66	25,85	12,57	23,91
				207.1, Lekki przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	35,96	37,76	44,83	38,78	17,68	35,96
Loratadyna Galena, tabl., 10 mg	90 szt. (9 blist. po 10 szt.)	05909990670260	207.1, Lekki przeciwhistaminowo do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne							

Dupilumab (Dupixent[®]) w leczeniu atopowego zapalenia skóry u młodzieży w wieku 12 - 17 lat

Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Grupa limitowa	Urzędowa cena zbytu	Cena hurtowa brutto	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania ^a	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy
	Loratatan, kaps. miewłkłe, 10 mg	30 szt. (2 blist. po 15 szt.)	05909990909049	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	12,74	13,38	16,91	12,93	7,86	12,74
	Loratatan, syrop, 5 mg/5 ml	125 ml	05909990839018	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,93	9,38	12,42	11,06	4,68	8,93

Spis tabel

[Redacted]	5
[Redacted]	5
[Redacted]	6
[Redacted]	9
[Redacted]	10
[Redacted]	14
[Redacted]	14
[Redacted]	14
[Redacted]	14
[Redacted]	15
[Redacted]	15
[Redacted]	15
[Redacted]	15
[Redacted]	15
[Redacted]	15
[Redacted]	16
[Redacted]	16
[Redacted]	16
[Redacted]	22
[Redacted]	22
[Redacted]	24
[Redacted]	26